

■ Het oprekken van de slokdarm bij passageklachten

Na een operatie aan de slokdarm kan er littekenweefsel ontstaan. Hierdoor wordt de slokdarm nauwer. Dit kan problemen geven met slikken. Ook zakt het eten hierdoor mogelijk niet goed meer (passageklachten).

Het is mogelijk om het littekenweefsel in de slokdarm op te rekken. Dit heet dilatatie. Tijdens een kijkonderzoek van de slokdarm en maag (gastroscopie) wordt de slokdarm wijder gemaakt. Dit gebeurt met een flexibele oprekstaaf (de zogenaamde Savary staaf) of een ballonnetje. Door het oprekken kan het voedsel beter kan passeren.

De behandeling moet meestal een paar keer herhaald worden.

Vorbereiding en nazorg

Vanaf 24 uur voor de ingreep mag u niet meer eten en drinken.

Vindt het onderzoek 's middags plaats? Dan mag u 's ochtends tot half 10 nog een licht ontbijt gebruiken (een beschuitje en een kopje thee) en iets drinken wat helder en vloeibaar is. Hierna moet u nuchter blijven, dit houdt in niets meer eten en drinken.

Voor de ingreep krijgt u een roesje. Hiervoor krijgt u een infuusnaaldje in uw arm.

Na de ingreep kunt u rustig uitslapen op de uitslaapkamer. Als er geen complicaties zijn opgetreden mag u dezelfde dag weer naar huis.

Mogelijke complicaties

Complicaties die kunnen optreden zijn het ontstaan van een gaatje (perforatie) of bloeding in de slokdarmwand of een longontsteking.

Wanneer moet u contact met ons opnemen?

Heeft u na het plaatsen van de stent last van:

- hevige buikpijn
- koorts (38 graden of hoger)
- flink bloedverlies (via mond of anus)
- pijn die niet weggaat
- hoesten bij elke hap of slok

Bel dan met de afdeling endoscopie. Op werkdagen tussen 8:30 en 16:30 belt u:

- locatie Alkmaar: 072 - 548 2850
- locatie Den Helder: 0223 - 69 6490
- locatie Schagen: 0224 - 53 2100

's Avonds, 's nachts en in het weekend belt u het algemene nummer van een van de locaties:

- locatie Alkmaar en Schagen: 072 - 548 4444
- locatie Den Helder: 0223 - 69 6969

U vraagt dan naar de dienstdoende MDL-arts.