

Behandeling van aangezichtspijn

Injectie in het foramen ovale

www.nwz.nl

Inhoud

Wat is aangezichtspijn (trigeminus neuralgie)?	3
Wat is een injectie in het foramen ovale?	4
Vorbereiding op de behandeling	4
De behandeling	6
Na de behandeling	7
Bijwerkingen	8
Complicaties	9
Uw vragen	9
Notities	11

In overleg met uw anesthesioloog-pijnspecialist van Noordwest Pijncentrum (Noordwest Ziekenhuisgroep) wordt u behandeld voor een bepaalde vorm van aangezichtspijn (trigeminus neuralgie). U krijgt een injectie met verdovende medicijnen in het foramen ovale. Dit is een opening in de schedelbasis. U wordt behandeld in Noordwest Pijncentrum of in het ziekenhuis zelf (Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar). In deze folder vindt u uitleg over de behandeling.

■ Wat is aangezichtspijn (trigeminus neuralgie)?

Trigeminus neuralgie (TN) is een bepaalde vorm van aangezichtspijn. Bij aangezichtspijn speelt de aangezichtszenuw (nervus trigeminus) een belangrijke rol. U kunt bij deze aandoening last hebben van heftige pijnscheuten in uw voorhoofd en oog, in uw bovenkaak en neus, en/of in uw onderkaak. Soms verdwijnt aangezichtspijn na enkele maanden of jaren vanzelf. Maar uw klachten kunnen daarna ook plotseling terugkeren.

Oorzaak

De neuroloog vindt maar zelden een duidelijke oorzaak. Een hersentumor bijvoorbeeld, of een bloedvat dat tegen de kern van de aangezichtszenuw (ganglion gasserii) drukt. Maar meestal is de oorzaak van uw klachten niet duidelijk.

Behandel mogelijkheden

Afhankelijk van uw situatie zijn bij aangezichtspijn de volgende behandelingen mogelijk:

- behandeling met medicijnen
- injectie met verdovende medicijnen in foramen ovale
- behandeling volgens Sweet (het met radiofrequente stroom verwarmen van de zenuw)
- operatie

In overleg met uw anesthesioloog-pijnspecialist krijgt u een injectie met verdovende medicijnen. Een anesthesioloog-pijnspecialist is een medisch specialist op het gebied van verdoving en pijnbestrijding.

■ Wat is een injectie in het foramen ovale?

U krijgt onder röntgendoorlichting een injectie met de verdovende medicijnen Chirocaïne en Depo-Medrol. De anesthesioloog-pijnspecialist brengt de naald via uw wang en het foramen ovale in naar de kern van de aangezichtszenuw.

Sedatie

Omdat de behandeling pijnlijk kan zijn, krijgt u sedatie. U valt dan in een lichte slaap. Meer informatie over sedatie vindt u in de folder 'Sedatie met Propofol' die u meekrijgt. In voorbereiding op de sedatie vult u van tevoren thuis een algemene vragenlijst in over uw gezondheid. U stuurt de ingevulde vragenlijst vóór de behandeling terug.

Resultaat

Het kan zijn dat u langere tijd minder pijn heeft. Maar het kan ook zijn dat u maar enkele uren tot dagen minder pijn heeft.

U bouwt de pijnmedicatie die u vóór de behandeling gebruikte, pas ná de injectie af. U doet dit altijd onder begeleiding van uw anesthesioloog-pijnspecialist. Stop dus nooit zonder overleg zelf met uw medicijnen.

■ Voorbereiding op de behandeling

Belangrijk om door te geven

Wilt u van tevoren via het telefonisch spreekuur of per mail doorgeven:

- welke bloedverdunnende en/of andere medicijnen u eventueel gebruikt: een compleet overzicht is verkrijgbaar bij uw apotheek
- als u overgevoelig bent voor jodium, contrastmiddelen met jodium, bepaalde medicijnen of pleisters
- als u zwanger bent

U vindt het telefoonnummer en e-mailadres van het Pijncentrum achter in deze folder.

Zijn deze gegevens al bekend bij het Pijncentrum? Dan hoeft u geen contact op te nemen.

Tijdelijk stoppen met bloedverdünnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdünnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u hier voor de behandeling tijdelijk mee moet stoppen. U kunt dit nakijken op het 'Instructieschema bloedverdünnende medicijnen' dat u meekrijgt. Volg deze instructies goed op. De behandeling kan anders waarschijnlijk niet doorgaan.

Heeft u geen instructieschema meegekregen?

Heeft u geen instructieschema meegekregen? Geef dit dan ruim van tevoren via het telefonisch spreekuur of per mail door. Dit betekent namelijk niet automatisch dat u gewoon met uw bloedverdünnende medicijnen kunt doorgaan.

Belangrijk: soms mag u niet zomaar met uw bloedverdünnende medicijnen stoppen

In bepaalde gevallen mag u niet zomaar met bloedverdünnende medicijnen stoppen. Als u recent gezondheidsproblemen heeft gehad waarvoor u bloedverdünnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld. Geldt dit voor u? Of twijfelt u hierover? Neem dan altijd voor overleg contact op met het Pijncentrum. Dat kan tijdens het dagelijkse telefonische spreekuur van 13:00 - 14:00 uur, telefoon 072 - 548 4224.

Eten en drinken

Omdat u sedatie krijgt moet u voor deze behandeling nuchter zijn. Dit betekent dat u een periode voor de behandeling niet mag eten en drinken. U kunt dit ook nalezen in de bevestigingsbrief die u thuisgestuurd krijgt.

Wat neemt u mee?

Wilt u het volgende meenemen:

- uw afsprakenkaartje met het registratie-etiket

- een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt: een overzicht is verkrijgbaar bij uw apotheek
- uw legitimatiebewijs

Onder begeleiding naar huis

De behandeling kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. U mag daarom de rest van de dag na de behandeling geen enkel vervoersmiddel besturen. U bent dan namelijk niet verzekerd als u een ongeluk veroorzaakt. Een voorwaarde voor de behandeling is dan ook dat iemand u na de behandeling naar huis brengt. Als u niemand heeft om u na de behandeling naar huis te brengen, kan uw behandeling niet doorgaan.

■ De behandeling

Geen pijn, koorts of antibiotica?

Heeft u al enkele dagen tot weken heel weinig of geen pijn? Of heeft u koorts? Of gebruikt u antibiotica? Neem dan contact op met het Pijncentrum om de afspraak te verzetten, of in overleg te annuleren.

Waar wordt u verwacht?

U wordt in Noordwest Pijncentrum behandeld of in het ziekenhuis, locatie Alkmaar van Noordwest Ziekenhuisgroep. U hoort dit van tevoren van een verpleegkundige. En dit staat ook in de bevestigingsbrief die u thuisgestuurd krijgt.

Noordwest Pijncentrum

Noordwest Pijncentrum is gevestigd aan de Wendelaarstraat 58 in Alkmaar. U kunt zich daar melden bij de receptie. Samen met uw begeleider neemt u vervolgens plaats in de 1e wachtruimte. Een polikliniekassistente begeleidt u daarna naar de 2e wachtruimte. Als u aan de beurt bent, neemt een assistente u mee naar de behandelruimte. Uw begeleider mag niet bij de behandeling zijn. Hij of zij kan in de 1e wachtruimte wachten tot u klaar bent.

In het ziekenhuis

Wordt u in het ziekenhuis, locatie Alkmaar van Noordwest Ziekenhuisgroep van Noordwest Ziekenhuisgroep behandeld? Dan kunt u zich melden bij de polikliniek voor pijnbestrijding op de 2e verdieping, huisnummer 228. De portier bij de hoofdingang of de ingang Metiusgracht wijst u graag even de weg. Ook in het ziekenhuis kan uw begeleider niet bij u blijven. Uw begeleider kan u na de behandeling op de dagbehandeling chirurgie (o28) weer ophalen.

De behandeling

U krijgt eerst een infuusnaald in uw arm of hand. Via dit infuus krijgt u een kortwerkend slaapmiddel (sedatie). Omdat u sedatie krijgt, worden uw hartslag en bloeddruk extra goed gecontroleerd. Uw hoofd en armen worden vastgezet met een bandje. Dit is belangrijk omdat u uw hoofd niet mag bewegen en aanraken. Als de naald op de juiste plaats staat, spuit de anesthesioloog-pijnspecialist de verdovende medicijnen Chirocaïne en Depo-Medrol in. In totaal duurt de behandeling ongeveer 3 kwartier.

Na de behandeling - Pijncentrum

Na de behandeling brengt de assistente u in een rolstoel of bed naar de verblijfsruimte. Een gastvrouw brengt dan ook meteen uw begeleider naar deze ruimte. Als u zich goed voelt, mag u na ongeveer 2 uur onder begeleiding naar huis.

Na de behandeling - in het ziekenhuis

Na de behandeling wordt u eerst naar de uitslaapkamer gebracht. Daarna gaat u naar de dagbehandeling chirurgie (o28). U mag na ongeveer 2 uur onder begeleiding naar huis.

■ Na de behandeling

Na de injectie let u goed op of uw pijnklachten veranderen en/of verminderen.

Controle

Afhankelijk van uw situatie komt u na een aantal weken voor controle op het spreekuur. Of de anesthesioloog-pijnspecialist of verpleegkundig pijnconsulent neemt dan telefonisch contact met u op.

Eventuele vervolgbehandeling

De anesthesioloog-pijnspecialist of verpleegkundig pijnconsulent bespreekt dan ook het eventuele vervolg met u. Heeft u maar enkele uren tot dagen minder pijn gehad? Dan krijgt u in overleg eventueel een behandeling volgens Sweet. Bij deze behandeling wordt de zenuw behandeld met Radio Frequente Stroom (RF-behandeling).

Meer informatie vindt u in de folder 'Behandeling van aangezichtspijn - behandeling volgens Sweet'. U vindt deze folder op onze website www.nwz.nl

Als u dat prettig vindt, kunnen we de folder ook opsturen.

■ Bijwerkingen

Doof gevoel in uw gezicht

Het kan zijn dat u na de behandeling een doof gevoel heeft in uw gezicht, op de plaats waar u eerst pijn had. Meestal verdwijnt dit dove gevoel binnen een paar maanden helemaal of gedeeltelijk. Uw pijn komt niet terug.

Bijwerkingen van Depo-Medrol

Depo-Medrol is een corticosteroïd (prednison-achtige stof). Mogelijke bijwerkingen van Depo-Medrol zijn:

- een warm en koortsig gevoel in het gezicht
- een iets heviger menstruatie, ook vrouwen in de overgang kunnen iets vaginaal bloedverlies hebben (dit geldt niet als uw baarmoeder verwijderd is)
- patiënten met diabetes die insuline gebruiken, kunnen enkele dagen last hebben van een verhoogde bloedglucose
- stemmingswisselingen
- de anticonceptiepil en het Mirena-spiraaltje kunnen gedurende 1 cyclus minder betrouwbaar zijn

Deze bijwerkingen duren meestal een paar dagen.

Het verdovende medicijn Chirocaïne heeft geen bijwerkingen.

■ Complicaties

De kans is klein, maar houdt u rekening met (één van) de volgende complicaties:

- tijdelijk hoofdpijn
- nabloeding
- in een zeldzaam geval hersenvliesontsteking, als er via het wangslimvlies mondbacteriën in het hersenvocht terechtkomen: u krijgt dan binnen 6 uur hoge koorts, hoofdpijn en nekstijfheid (u moet dan zo snel mogelijk starten met antibiotica)

Krijgt u (één van) deze klachten? Of krijgt u binnen 6 uur na de behandeling meer dan 38,5 graden koorts? Neem dan meteen contact op met het Pijncentrum of uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

■ Uw vragen

Telefonisch spreekuur

U kunt voor medisch inhoudelijke vragen tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen met de verpleegkundig pijnconsulent. Dat kan op werkdagen van 13:00 - 14:00 uur, telefoon 072 - 548 4224.

Een afspraak verzetten

Voor het verzetten van een afspraak kunt u contact opnemen met een polikliniekassistente van Noordwest Pijncentrum. Dat kan op werkdagen van 09:00 - 16:30 uur, telefoon 072 - 548 4224.

U kunt dit nummer ook bellen met eventuele administratieve vragen.

U kunt uw vraag ook mailen

U kunt uw vraag ook mailen naar pijnbestrijding@nwz.nl. Vermeld ook uw naam en geboortedatum.

Afhankelijk van uw vraag nemen wij dan binnen 1 of 2 werkdagen contact met u op.

Meer informatie over het Noordwest Pijncentrum, bereikbaarheid en parkeren vindt u op www.nwz.nl/pijnbestrijding

Afspraak pijnpolikliniek Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder

Heeft u een afspraak gehad op de pijnpolikliniek van locatie Den Helder? En bent u verwezen naar Noordwest Pijncentrum voor uw behandeling? Dan hoeft u voor uw vragen geen contact op te nemen met het Pijncentrum. U kunt voor al uw vragen terecht bij de pijnpolikliniek van locatie Den Helder.

Dat kan op werkdagen van 09:00 - 10:00 uur en 13:00 - 14:00 uur.

Op vrijdag van 09:00 - 10:00 uur, telefoon 0223 - 69 6903.

Noordwest Ziekenhuisgroep

Postbus 501

1800 AM Alkmaar

www.nwz.nl

tel 072 - 548 4444

Colofon

Redactie Noordwest Pijncentrum
afdeling communicatie

Vormgeving vormgeving Noordwest Ziekenhuisgroep

Druk Ricoh Nederland

Artikel nr 186173/2017.06

Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl.