

Behandeling van aangezichtspijn

Ganglion pterygopalatinum

www.nwz.nl

Inhoud

Behandeling van aangezichtspijn met medicijnen	3
Vorbereiding op de behandeling	4
De behandeling	5
Na de behandeling	7
Bijwerkingen	7
Complicaties	8
Uw vragen	9
Notities	9

In overleg met uw anesthesioloog-pijnspecialist van Noordwest Pijncentrum (Noordwest Ziekenhuisgroep) wordt u behandeld voor zogenoemde clusterhoofdpijn of atypische aangezichtspijn. U krijgt een injectie met verdovende medicijnen. U wordt behandeld in Noordwest Pijncentrum of in het ziekenhuis zelf (Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar). In deze folder vindt u uitleg over de behandeling.

■ **Behandeling van aangezichtspijn met medicijnen**

Achter in de neusholte zit een zenuwknoopje, het zogenoemde ganglion pterygopalatinum. Door dit knoopje lopen zenuwvezels die een rol kunnen spelen bij clusterhoofdpijn en/of atypische aangezichtspijn. U kunt bij atypische aangezichtspijn last hebben van chronische pijn in het gezicht. Mede om te achterhalen welke zenuwvezel mogelijk een rol speelt bij uw klachten, krijgt u een injectie met de verdovende medicijnen Chirocaïne en Depo-Medrol. De behandeling wordt uitgevoerd door een anesthesioloog-pijnspecialist. Dit is een medisch specialist op het gebied van verdoving en pijnbestrijding.

Sedatie

Omdat de behandeling pijnlijk kan zijn, krijgt u sedatie. U valt dan in een lichte slaap. Meer informatie over sedatie vindt u in de folder 'Sedatie met Propofol' die u dan meekrijgt. In voorbereiding op de sedatie vult u van tevoren thuis een algemene vragenlijst in over uw gezondheid. U stuurt de ingevulde vragenlijst vóór de behandeling terug.

Resultaat

Het kan zijn dat u langere tijd minder pijn heeft. Maar het kan ook zijn dat u maar enkele uren tot dagen minder pijn heeft. De behandeling kan dan zo nodig herhaald worden.

U bouwt de pijnmedicatie die u vóór de behandeling gebruikte, pas ná de injectie af. U doet dit altijd onder begeleiding van uw anesthesioloog-pijnspecialist. Stop dus nooit zonder overleg zelf met uw medicijnen.

■ Voorbereiding op de behandeling

Belangrijk om door te geven

Wilt u van tevoren via het telefonisch spreekuur of per mail doorgeven:

- welke bloedverdünnende en/of andere medicijnen u eventueel gebruikt: een compleet overzicht is verkrijgbaar bij uw apotheek
- als u overgevoelig bent voor jodium, contrastmiddelen met jodium, bepaalde medicijnen of pleisters
- als u zwanger bent

U vindt het telefoonnummer en e-mailadres van het Pijncentrum achter in deze folder. Zijn deze gegevens al bekend bij het Pijncentrum? Dan hoeft u geen contact op te nemen.

Tijdelijk stoppen met bloedverdünnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdünnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u hier voor de behandeling tijdelijk mee moet stoppen. U kunt dit nakijken op het 'Instructieschema bloedverdünnende medicijnen' dat u meekrijgt. Volg deze instructies goed op. De behandeling kan anders waarschijnlijk niet doorgaan.

Heeft u geen instructieschema meegekregen?

Heeft u geen instructieschema meegekregen? Geef dit dan ruim van tevoren via het telefonisch spreekuur of per mail door. Dit betekent namelijk niet automatisch dat u gewoon met uw bloedverdünnende medicijnen kunt doorgaan.

Belangrijk:

soms mag u niet zomaar met uw bloedverdünnende medicijnen stoppen

In bepaalde gevallen mag u niet zomaar met bloedverdünnende medicijnen stoppen. Als u recent gezondheidsproblemen heeft gehad waarvoor u bloedverdünnende medicijnen gebruikt bijvoorbeeld. Geldt dit voor u? Of twijfelt u hierover? Neem dan altijd voor overleg contact op met het Pijncentrum. Dat kan tijdens het dagelijkse telefonische spreekuur van 13:00 tot 14:00 uur, telefoon 072 - 548 4224.

Eten en drinken

Omdat u sedatie krijgt, moet u voor deze behandeling nuchter zijn. Dit betekent dat u een periode voor de behandeling niet mag eten en drinken. U kunt dit ook nalezen in de bevestigingsbrief die u thuisgestuurd krijgt.

Wat neemt u mee?

Wilt u het volgende meenemen:

- uw afsprakenkaartje met het registratie-etiket
- een overzicht van alle medicijnen die u (eventueel) gebruikt: een overzicht is verkrijgbaar bij uw apotheek
- uw legitimatiebewijs

Onder begeleiding naar huis

De behandeling kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. U mag daarom de rest van de dag na de behandeling geen enkel vervoersmiddel besturen. U bent dan namelijk niet verzekerd als u een ongeluk veroorzaakt. Een voorwaarde voor de behandeling is dan ook dat iemand u na de behandeling naar huis brengt. Als u niemand heeft om u na de behandeling naar huis te brengen, kan uw behandeling niet doorgaan.

■ De behandeling

Geen pijn, koorts of antibiotica?

Heeft u al enkele dagen tot weken heel weinig of geen pijn? Of heeft u koorts? Of gebruikt u antibiotica? Neem dan contact op met het Pijncentrum om de afspraak te verzetten, of in overleg te annuleren.

Waar wordt u verwacht?

U wordt in Noordwest Pijncentrum behandeld of in het ziekenhuis, locatie Alkmaar van Noordwest Ziekenhuisgroep. U hoort dit van tevoren van een verpleegkundige. En het staat in de bevestigingsbrief die u thuisgestuurd krijgt.

Noordwest Pijncentrum

Noordwest Pijncentrum is gevestigd aan de Wendelaarstraat 58 in Alkmaar. U kunt zich daar melden bij de receptie. Samen met uw begeleider neemt u vervolgens plaats in de 1e wachtruimte. Een polikliniekassistente begeleidt u daarna naar de 2e wachtruimte. Als u aan de beurt bent, neemt een assistente u mee naar de behandelruimte. Uw begeleider mag niet bij de behandeling zijn. Hij of zij kan in de 1e wachtruimte wachten tot u klaar bent.

In het ziekenhuis

Wordt u in het ziekenhuis, locatie Alkmaar van Noordwest Ziekenhuisgroep behandeld? Dan kunt u zich melden bij de polikliniek voor pijnbestrijding op de 2e verdieping, huisnummer 228. De portier bij de hoofdingang of de ingang Me-tiusgracht wijst u graag even de weg. Ook in het ziekenhuis, locatie Alkmaar van Noordwest Ziekenhuisgroep kan uw begeleider niet bij u blijven. Uw begeleider kan u na de behandeling op de dagbehandeling chirurgie (o28) ophalen.

De injectie

Behalve de anesthesioloog-pijnspecialist zijn ook een assistent en sedatiemedewerker bij de behandeling aanwezig. U ligt op uw rug op een behandel-tafel. U krijgt eerst een infuusnaald in uw arm of hand. Via dit infuus krijgt u een kortwerkend slaapmiddel (sedatie). Omdat u sedatie krijgt, worden uw hartslag en bloeddruk extra goed gecontroleerd. Uw hoofd en armen worden met een bandje licht vastgezet. Dit is belangrijk omdat u uw hoofd niet mag bewegen en aanraken.

De anesthesioloog-pijnspecialist tekent met behulp van röntgendoorlichting de plaats voor de injectie af. Daarna wordt uw huid plaatselijk verdoofd. Vervol-gens plaatst de anesthesioloog-pijnspecialist via uw wang een dunne naald dichtbij het zenuwknoopje. De anesthesioloog-pijnspecialist spuit via deze naald de verdovende medicijnen Chirocaïne en Depo-Medrol in. De behandeling duurt in totaal ongeveer 3 kwartier.

Na de behandeling - Pijncentrum

Na de behandeling brengt de assistente u in een rolstoel of bed naar de verblijfs-

ruimte. Een gastvrouw brengt dan ook meteen uw begeleider naar deze ruimte. Als u zich goed voelt, mag u na ongeveer 2 uur onder begeleiding naar huis.

Na de behandeling - in het ziekenhuis

Na de behandeling wordt u eerst naar de uitslaapkamer gebracht. Daarna gaat u naar de dagbehandeling chirurgie (o28). U mag na ongeveer 2 uur onder begeleiding naar huis.

■ Na de behandeling

Na de injectie let u goed op of uw pijnklachten veranderen en/of verminderen.

Controle

Afhankelijk van uw situatie komt u na een aantal weken voor controle op het spreekuur. Of de anesthesioloog-pijnspecialist of verpleegkundig pijnconsulent neemt telefonisch contact met u op.

Eventuele vervolgbehandeling

De verpleegkundig pijnconsulent of arts bespreekt dan ook het eventuele vervolg met u. Bij een positief effect kunt u baat hebben bij een behandeling met Radio Frequente stroom (RF-behandeling). Ook als u alleen het eerste uur of de eerste uren na de injectie duidelijk minder pijn had, heeft deze vervolgbehandeling zin. Een RF-behandeling heeft vaak een langduriger effect.

Meer informatie vindt u in de folder 'Behandeling van aangezichtspijn - RF-behandeling van ganglion pterygopalatinum'. U vindt deze folder op onze website www.nwz.nl/pijnbestrijding. Als u dat prettig vindt, kunnen we de folder ook opsturen.

■ Bijwerkingen

Napijn

Het kan zijn dat u napijn krijgt. Dit gaat na een paar dagen tot weken vanzelf over. U kunt zo nodig volgens voorschrift paracetamol gebruiken.

Dubbelzien

De kans is heel klein, maar het kan zijn dat u een paar uur na de behandeling dubbelziet. Dit gaat vanzelf over.

Bloeditstorting wang

Het is mogelijk dat u een bloeditstorting in de wang krijgt. Dit gaat vanzelf over.

Bijwerkingen van Depo-Medrol

Depo-Medrol is een corticosteroïd (prednison-achtige stof). Mogelijke bijwerkingen van Depo-Medrol zijn:

- een warm en koortsig gevoel in het gezicht
- een iets heviger menstruatie, ook vrouwen in de overgang kunnen iets vaginaal bloedverlies hebben (dit geldt niet als uw baarmoeder verwijderd is)
- patiënten met diabetes die insuline gebruiken, kunnen enkele dagen last hebben van een verhoogde bloedglucose
- stemmingswisselingen
- de anticonceptiepil en het Mirena-spiraaltje kunnen gedurende 1 cyclus minder betrouwbaar zijn

Deze bijwerkingen duren meestal een paar dagen.

Het verdovende medicijn Chirocaïne heeft geen bijwerkingen.

■ Complicaties

De kans is klein, maar houdt u rekening met (één van) de volgende complicaties:

- nabloeding
- infectie: u herkent een infectie aan roodheid van de huid en koorts
- doof gevoel in uw gehemelte: dit gaat binnen een maand meestal vanzelf over
- bloedneus: zo nodig wordt dit door een KNO-arts behandeld

Krijgt u (één van) deze klachten? Of krijgt u **binnen 6 uur** na de behandeling meer dan 38,5 graden koorts? Neem dan meteen contact op met het Pijncentrum of uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

■ Uw vragen

Telefonisch spreekuur

U kunt voor medisch inhoudelijke vragen tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen met de verpleegkundig pijnconsulent. Dat kan op werkdagen van 13:00 tot 14:00 uur, telefoon 072 - 548 4224.

Een afspraak verzetten

Voor het verzetten van een afspraak kunt u contact opnemen met een polikliniekassistent van Noordwest Pijncentrum. Dat kan op werkdagen van 09:00 tot 16:30 uur, telefoon 072 - 548 4224. U kunt dit nummer ook bellen met eventuele administratieve vragen.

U kunt uw vraag ook mailen

U kunt uw vraag ook mailen naar pijnbestrijding@nwz.nl. Vermeld ook uw naam en geboortedatum. Afhankelijk van uw vraag nemen wij dan binnen 1 of 2 werkdagen contact met u op.

Meer informatie over Noordwest Pijncentrum, bereikbaarheid en parkeren vindt u op www.nwz.nl/pijnbestrijding.

■ Notities

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Afspraak pijnpolikliniek Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder
Heeft u een afspraak gehad op de pijnpolikliniek van locatie Den Helder?
En bent u verwezen naar Noordwest Pijncentrum voor uw behandeling?
Dan hoeft u voor uw vragen geen contact op te nemen met het Pijncentrum. U kunt voor al uw vragen terecht bij de pijnpolikliniek van locatie Den Helder. Dat kan op werkdagen van 09:00 tot 10:00 uur en 13:00 tot 14:00 uur. Op vrijdag van 09:00 tot 10:00 uur, telefoon 0223 - 69 6903.

Noordwest Ziekenhuisgroep

Postbus 501

1800 AM Alkmaar

www.nwz.nl

tel 072 - 548 4444

Colofon

Redactie	Noordwest Pijncentrum afdeling communicatie
Vormgeving	vormgeving Noordwest Ziekenhuisgroep
Druk	Ricoh Nederland
Artikel nr	186965/2017.06

Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl.