

Patiëntenvoorlichting

Instructieschema bloedverdunners

Pijncentrum

[Ruimte voor patiëntetiket]

In onderstaand schema kunt u aflezen welke bloedverdunnende medicijnen u moet staken. Ook leest u wanneer u moet stoppen en wanneer u weer kunt starten met het innemen van het medicijn.

Uw behandeling vindt plaats op

<input type="checkbox"/> Acenocoumarol	
- wanneer stoppen?	3 dagen voor de behandeling of volgens afspraak van de trombosedienst
- wanneer weer starten?	na behandeling op reguliere tijd
<input type="checkbox"/> Fenprocoumon (Marcoumar)	
- wanneer stoppen?	5 dagen voor de behandeling of volgens afspraak van de trombosedienst
- wanneer weer starten?	na behandeling op reguliere tijd
<input type="checkbox"/> Nadroparine (Fraxiparine)	
- wanneer stoppen?	24 uur voor behandeling
- wanneer weer starten?	24 uur na behandeling
<input type="checkbox"/> Dabigatran (Pradaxa)	
- wanneer stoppen?	<input type="checkbox"/> 48 uur voor de behandeling <input type="checkbox"/> 72 uur voor de behandeling <input type="checkbox"/> 96 uur voor de behandeling
- wanneer weer starten?	24 uur na behandeling
<input type="checkbox"/> Apixaban (Eliquis)	
- wanneer stoppen?	48 uur voor de behandeling
- wanneer weer starten?	24 uur na behandeling
<input type="checkbox"/> Rivaroxaban (Xarelto)	
- wanneer stoppen?	48 uur voor de behandeling
- wanneer weer starten?	24 uur na behandeling
<input type="checkbox"/> Edoxaban (Lixiana)	
- wanneer stoppen?	48 uur voor de behandeling
- wanneer weer starten?	24 uur na behandeling

<input type="checkbox"/> ASA (Ascal, Ascal Cardio, Carbasalaatcalcium (Cardio))	dit medicijn kunt u blijven gebruiken
<input type="checkbox"/> Acetylsalicylzuur (Asprine, Aspégic, Alka-Seltzer, Aspro)	dit medicijn kunt u blijven gebruiken
<input type="checkbox"/> Dipyridamol (Persantin, Asasantin)	dit medicijn kunt u blijven gebruiken
<input type="checkbox"/> Clopidogrel (Grepid, Plavix)	
- wanneer stoppen?	7 dagen voor de behandeling
- wanneer weer starten?	7 uur na behandeling
<input type="checkbox"/> Prasugrel (Efient)	
- wanneer stoppen?	7 dagen voor de behandeling
- wanneer weer starten?	7 uur na behandeling
<input type="checkbox"/> Ticagrelor (Brilique)	
- wanneer stoppen?	5 dagen voor de behandeling
- wanneer weer starten?	7 uur na behandeling

Uw vragen

Heeft u vragen over dit schema? Neemt u dan contact op met Noordwest Pijncentrum. Dat kan op werkdagen van 13:00 - 14:00 uur, telefoon 072 - 548 4224.

U kunt uw vraag ook mailen naar pijnbestrijding@nwz.nl. Afhankelijk van uw vraag nemen wij dan binnen 1 of 2 werkdagen contact met u op.