

Patiëntenvoorlichting

Behandeling van reumatische klachten met medicijnen

Colchicine

Behandeling met colchicine

In overleg met uw reumatoloog wordt u binnenkort voor uw reumatische klachten behandeld met het medicijn colchicine. In deze folder vindt u uitleg over deze behandeling.

Deze folder vervangt niet de gebruiksaanwijzing bij het geneesmiddel.

Hoe werkt colchicine?

Colchicine vermindert de ontstekingsreactie in de gewrichten. Hierdoor worden pijn en zwelling van de gewrichten minder. Colchicine wordt bij verschillende vormen van reuma voorgeschreven. Onder andere bij jicht, pseudo-jicht en de ziekte van Behçet.

Wanneer merkt u iets van de behandeling?

Colchicine werkt snel, meestal binnen 12 uur. Colchicine wordt daarom soms ook gebruikt om aanvallen van gewrichtsontsteking te voorkomen.

Gebruiksaanwijzing

U krijgt colchicine in de vorm van tabletten van 0,5 mg. Uw neemt de tabletten in met water. Neem de tabletten **nooit** in met grapefruitsap!

Wanneer mag u colchicine niet gebruiken?

U mag colchicine niet gebruiken:

- bij een sterk verminderde werking van de lever en/of nieren
- bij een sterk verminderde aanmaak van bloedcellen
- als u zwanger wilt worden, zwanger bent of borstvoeding geeft

Mag u colchicine combineren met andere medicijnen?

In overleg met uw reumatoloog kunt u onder andere de volgende medicijnen beter niet tegelijk met colchicine gebruiken:

- verapamil (Isoptin®): dit is een middel tegen hartritmestoornissen
- claritromycine (Klacid®) en erytromycine: dit zijn antibiotica
- cimetidine: dit zijn maagtabletten
- tolbutamide: dit is een medicijn bij suikerziekte

Gebruikt u colchicine in combinatie met cholesterolverlagende medicijnen (statines)? Dan heeft u een grotere kans op (hevige) spierpijn.

U kunt colchicine verder bijna met alle medicijnen combineren. Bespreek wel altijd met uw huisarts, reumatoloog, andere medisch specialist(en), apotheker en trombosedienst welke medicijnen u eventueel gebruikt.

Mogelijke bijwerkingen

Dit zijn de bijwerkingen die het meest voorkomen:

- maag- en darmklachten zoals diarree, misselijkheid en overgeven
- verminderde aanmaak van bloedcellen
- spierpijn en verminderde spierkracht
- haaruitval
- zenuwbeschadiging
- nierbeschadiging

Bij welke klachten waarschuwt u uw reumatoloog?

Neem bij (één van) de volgende klachten contact op met uw reumatoloog:

- erge keelpijn in combinatie met koorts
- regelmatig een bloedneus
- snel blauwe plekken
- zeer hevige spierpijn en/of spierzwakte

Deze bijwerkingen verdwijnen meestal bij een lagere dosering, of als u in overleg met uw reumatoloog met colchicine stopt. Na herstel kunt u in overleg vaak weer met colchicine starten.

Controle

Voor controle van de aanmaak van bloed, wordt uw bloed regelmatig onderzocht. Ook heeft u tijdens de behandeling regelmatig een controleafspraak met de reumatoloog en reumaconsulent op de polikliniek reumatologie.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Mannen

Colchicine kan soms leiden tot een (tijdelijk) verminderde zaadproductie. Hierdoor ontstaat soms verminderde vruchtbaarheid bij mannen.

Vrouwen

U mag tijdens de behandeling met colchicine niet zwanger worden. Gebruik daarom betrouwbare voorbehoedsmiddelen. U mag ook geen borstvoeding geven. Heeft u een kinderwens? Of bent u onverwacht zwanger geworden? Bespreek dit dan altijd met uw reumatoloog.

De grieprik en vaccinaties voor een verre reis

We raden u aan om bij gebruik van colchicine jaarlijks de grieprik te halen bij uw huisarts. Heeft u plannen voor een verre reis waarvoor u vaccinaties nodig heeft? Bespreek dit dan altijd ruim van tevoren met uw reumatoloog. Vaccinaties met verzwakt levende vaccins - denk onder andere aan de bof, mazelen, gele koorts - kunnen namelijk niet met colchicine worden gecombineerd.

Uw vragen

Met vragen over uw aandoening en de behandeling kunt u op werkdagen van 08:30 tot 16:30 uur contact opnemen met de polikliniek reumatologie:

- locatie Alkmaar, telefoon 072 - 548 3250
- locatie Den Helder, telefoon 0223 - 69 6902