

Patiëntenvoorlichting

Behandeling van reumatische klachten met medicijnen

Salazopyrine

Behandeling van uw klachten met Salazopyrine

In overleg met uw reumatoloog wordt u binnenkort voor uw reumatische klachten behandeld met het geneesmiddel Salazopyrine. In deze folder vindt u uitleg over deze behandeling.

Deze folder is geen vervanging van de gebruiksaanwijzing bij het geneesmiddel.

Hoe werkt Salazopyrine?

Bij reumatische aandoeningen zijn de gewrichten langdurig ontstoken, waardoor deze beschadigd kunnen raken. Salazopyrine hoort bij een groep medicijnen die deze ontstekingsprocessen onderdrukt, de zogenoemde DMARD's (Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs). Stijfheid, pijn en zwelling van gewrichten nemen daardoor af. Als de ontstekingen in uw gewrichten minder worden, is de kans op beschadigingen in de gewrichten op langere termijn ook kleiner. U bent verder minder moe en kunt beter functioneren in het dagelijks leven.

Wanneer merkt u iets van de behandeling?

DMARD's werken meestal langzaam. Het kan dan ook 6 tot 8 weken duren voordat u iets van de behandeling merkt. Uw reumatoloog adviseert u daarom meestal om naast Salazopyrine (tijdelijk) ook nog andere pijnstillende en ontstekingsremmende medicijnen te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

Uw reumatoloog schrijft u tabletten voor van 500 mg. U bouwt het gebruik in 4 weken op. Volg daarbij de instructies in dit schema.

	ochtend	avond
Week 1	0 tabletten	1 tablet
Week 2	1 tablet	1 tablet
Week 3	1 tablet	2 tabletten
Week 4 en daarna	2 tabletten	2 tabletten

Hoe neemt u de tabletten in?

Neem de tabletten tijdens of tussen de maaltijden door in, bij voorkeur met water. Het is belangrijk dat u de tabletten niet breekt of kauwt, maar heel doorslikt. Bent u de tabletten vergeten in te nemen?

Neem deze dan later op dezelfde dag nog in.

Bewaren Salazopyrine

Bewaar Salazopyrine buiten het bereik van kinderen, op een droge donkere plaats.

Wees voorzichtig met alcohol

Alcohol in combinatie met Salazopyrine kan maagklachten veroorzaken. Gebruik daarom niet meer dan 1 glas alcohol per dag.

Salazopyrine in combinatie met andere medicijnen

Bij gelijktijdig gebruik kunnen bepaalde medicijnen de bloedspiegel van Salazopyrine en de eventuele bijwerkingen beïnvloeden. Andersom kan Salazopyrine de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Geef daarom altijd aan uw eventuele andere medisch specialist(en) en/of uw huisarts door dat u wordt behandeld met Salazopyrine. Geef ook door welke medicijnen u eventueel nog meer gebruikt.

Bijwerkingen van Salazopyrine

Uw urine kan door gebruik van Salazopyrine geeloranje van kleur worden. U hoeft zich hier geen zorgen over te maken. Houdt u verder rekening met (een van) de volgende bijwerkingen.

Deze bijwerkingen komen **vaak** voor (meer dan 10%):

- misselijkheid, minder eetlust, braken, buikpijn
- hoofdpijn

Deze bijwerkingen komen **soms** voor (1-10%):

- huiduitslag
- jeuk
- duizeligheid
- depressieve gevoelens

Deze bijwerkingen komen **bijna nooit** voor (minder dan 1%):

- stoornissen in de bloedaanmaak door onderdrukking van het beenmerg: dit kan infecties, vermoeidheid en (spontane) blauwe plekken en bloedneuzen veroorzaken
- lever- of nierfunctiestoornissen
- allergische reactie: u kunt last krijgen van een rode huid, kortademigheid, dikke lippen en/of een dik gezicht

Wanneer waarschuwt u uw (huis)arts?

Neem bij klachten contact op met uw reumatoloog of reumaconsulent. Krijgt u klachten die kunnen wijzen op een allergische reactie? Waarschuw dan **meteen** uw huisarts of reumatoloog.

Controles

Zo'n 4 weken nadat u met Salazopyrine bent gestart, neemt uw reumaconsulent telefonisch contact met u op. U bespreekt dan hoe het met u gaat, of u eventueel last heeft van bijwerkingen, en u krijgt de uitslagen van bloedonderzoek. (Zie ook 'Bloedonderzoek' hieronder.) U heeft na zo'n 3 maanden een controleafspraak met uw reumatoloog en reumaconsulent op de polikliniek reumatologie.

Bloedonderzoek

Een mogelijke bijwerking van Salazopyrine is een leverfunctiestoornis. Om dit vroegtijdig op te sporen, wordt uw bloed regelmatig gecontroleerd. Onder andere op eventuele afname van witte bloedcellen en/of bloedplaatjes. U laat daarom vóór iedere controleafspraak bloedprikken. Het is erg belangrijk dat u zich goed aan deze afspraken voor bloedonderzoek houdt. Een eventuele afwijkende uitslag van de leverfunctie is meestal van voorbijgaande aard.

Medicijnen bestellen tijdens de controles

Wilt u al uw medicijnen zoveel mogelijk tijdens de controles bij uw reumatoloog of reumaconsulent bestellen? Doet u dit toch telefonisch? Geef dan de dosering en voorgeschreven hoeveelheid duidelijk door.

Vaccinaties

Griep prik

Wij adviseren u om bij gebruik van Salazopyrine jaarlijks een griep prik bij uw huisarts te halen.

Vaccinaties voor een verre reis

Heeft u aanvullende vaccinaties (inenting) nodig voor een verre reis? Overleg dit dan **altijd** eerst met uw reumatoloog. U kunt u namelijk beter niet laten vaccineren met een verzwakt levend vaccin. Denkt u aan vaccinaties voor de bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts, tyfus, BCG en/of polio.

Zwangerschap en borstvoeding

Vrouwen

Wilt u zwanger worden of bent u zwanger? Bespreekt dit dan altijd met uw reumatoloog. Als u dagelijks meer dan 2 mg Salazopyrine gebruikt, worden uw medicijnen zo nodig in overleg aangepast of vervangen. Geeft u borstvoeding? Dan is maximaal een dosering van tweemaal daags 2 tabletten toegestaan.

Mannen

Salazopyrine kan onvruchtbaarheid veroorzaken doordat de kwaliteit en de hoeveelheid zaadcellen afneemt. Dit herstelt na stopzetten van de behandeling vanzelf.

Uw vragen

Met vragen over uw aandoening en behandeling kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek reumatologie. Dat kan op werkdagen van 8:30 - 16:30 uur via de polikliniek reumatologie:

- locatie Alkmaar, telefoon 072 - 548 3250
- locatie Den Helder, telefoon 0223 - 69 6902