

Navelbreuk

De littekenring die de plaats markeert waar de navelstreng voor de geboorte het kind met de moeder verbond, blijft altijd een zwakke plek op het lichaam. Bij jonge kinderen is het niet uitzonderlijk dat op deze plaats een bult te zien is, waar de ingewanden uit de buik naar voren duwen. Als het kind hoest of schreeuwt ziet men deze uitstulping groter worden.

Een navelbreuk (hernia umbilicalis) kan al direct na de geboorte geconstateerd worden, maar kan ook tijdens het eerste levensjaar ontstaan, doordat het litteken niet stevig genoeg is. Bij volwassenen komt deze aandoening niet vaak voor.

Wel lopen gezette vrouwen met slappe buikspieren tijdens de zwangerschap de kans een navelbreuk te krijgen. Door de sterk toenemende druk op de buikwand raakt de navel overrekt en 'breekt'.

Medische behandeling van een navelbreuk

Een navelbreuk (hernia umbilicalis) hoeft doorgaans bij jonge kinderen niet operatief behandeld te worden.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie – heelkunde van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 12.00 uur op telefoon (0223) 69 62 37.

