

Split Skin Graft

Inleiding

Deze folder geeft een globaal overzicht van de behandeling van een Split Skin Graft.

Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van de aandoening de situatie voor iedereen anders kan zijn.

Wat is een Split Skin Graft?

Bij een Split Skin Graft wordt er een huidlapje over een niet-helende wond geplaatst.

De operatie

Het huidlapje wordt meestal verwijderd van het bovenbeen door middel van een schaaaf. Dit wordt dan op de open wond geplaatst en vastgeniet.

Na behandeling

De wond blijft ongeveer 5 dagen ingepakt en wordt de eerste keer door de chirurg uitgepakt.

De chirurg zal dan verder beleid afspreken. U heeft de eerste dagen na de behandeling bedrust om de wond de benodigde rust te geven. De donorplaats blijft lange tijd ingepakt.

Het verband, wat vastgeplakt zit, laten zitten tot het er vanzelf afvalt of loslaat.

Mogelijke complicaties

Het niet aanslaan van de huidlap (graft).

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 12.00 uur. Telefoonnummer (0223) 69 62 37.