



Koemelkprovocatietest

Waarom krijgt uw kind dit onderzoek?

Met dit onderzoek kan worden vastgesteld of uw kind een koemelkallergie heeft.

Hoelang duurt dit onderzoek?

- Uw kind wordt 2 keer opgenomen op de kinderafdeling, op 2 verschillende dagen met een tussenpoos van minimaal 1 week
- U dient er rekening mee te houden dat u van 10:00 tot 16:00 uur met het onderzoek bezig bent

Waarom deze folder?

Deze folder geeft uw informatie over de dubbel blinde placebocontroleerde koemelkprovocatietest.

We geven u uitleg over:

- Het voorbereiden op de test
- Wat er gebeurt tijdens de test
- Welke reacties er kunnen optreden
- Wat u mee krijgt tijdens ontslag
- Wanneer u de uitslag krijgt

Vorbereiding op de test

- Tijdens polikliniek bezoek of telefonisch contact met de arts wordt er een afspraak gemaakt voor de test
- Uw kind dient gedurende minstens 4 weken voorafgaande aan de test een koemelk vrije voeding te drinken
- Bij borstvoeding dient de moeder een volledig koemelkvrij dieet te volgen
- Bij kinderen met eczeem kan de test alleen uitgevoerd worden als het eczeem zich in een rustige fase bevindt
Minimaal 48 uur voor de provocatietest mag er geen corticosteroïdenzalf gebruikt worden
- Antihistaminica dienen 3 dagen voor de test gestaakt te worden

Wat gebeurt er tijdens de test?

- Bij opname wordt het gewicht en de lengte opgenomen
- Uw kind krijgt de ene week een placebovoeding (voeding zonder koemelk) en de andere week een verumvoeding (voeding met koemelk) te drinken in een willekeurige volgorde

- Tijdens de testdagen is alleen de kinderverpleegkundige die de voeding klaarmaakt op de hoogte van de samenstelling van de voeding
- Voor de toediening van de 1e hoeveelheid provocatievoeding wordt een observatie uitgevoerd
- De observaties bestaan uit controle van: mond/lippen/mondkeelholte/gelaat, neus, ogen, maagarmkanaal, huid, lagere luchtwegen, overige klachten
- Deze observaties worden voor elke volgende voeding herhaald
- Tijdens de test wordt het onderstaande schema ingevuld

Tijd (min)	Handeling	Verschijnselen
T=0	Binnenzijde lip met melk bevochtigen Indien binnen 15 minuten geen reactie→	
T=15	5 ml melk laten drinken Indien na 30 minuten geen reactie→	
T=45	15 ml melk laten drinken Indien na 30 minuten geen reactie→	
T=75	30 ml melk laten drinken Indien na 30 minuten geen reactie→	
T=105	60 ml melk laten drinken Indien na 30 minuten geen reactie→	
T=145	90 ml laten drinken Indien na 45 minuten geen reactie→	
T=190	Ontslag	

Welke reacties kunnen er optreden?

- Bij minder duidelijke verschijnselen, zoals huilen, buikpijn, krampen en roodheid van/in de mond, wordt de laatst gegeven hoeveelheid testvoeding herhaald; indien de klachten opnieuw optreden wordt de provocatie gestaakt
- Bij duidelijke verschijnselen, zoals benauwdheid, braken, galbulten, dikke lippen, wordt de provocatie gestaakt

Ontslag

- U krijgt een observatielijst mee naar huis voor registratie van eventuele late reacties
- U houdt de medicatie klaar voor onderweg naar huis of thuis om toe te dienen als er late reacties optreden
- Thuis krijgt uw kind weer de voeding die hij/zij gewend was

Wanneer krijgt u de uitslag?

- De samenstelling van de testvoedingen wordt 1 à 2 weken nadat beide testdagen volledig zijn afgerond bekend gemaakt
- De kinderarts bespreekt met u het resultaat van de provocatietest

Heeft u nog vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen over dit onderzoek.

Dan kunt u altijd bellen naar de polikliniek kindergeneeskunde.

De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur op telefoonnummer 0223 - 69 6449.

