

## Thoracoscopie

U bent door uw longarts verwezen naar de functieafdeling voor een thoracoscopie. U wordt hiervoor opgenomen op de afdeling. Dit onderzoek vindt plaats aangezien er sprake is van vocht achter de longen (pleuravocht) of een ingeklapte long (pneumothorax). De ruimte die hierdoor ontstaan is, is gemakkelijk toegankelijk voor onderzoek. Bij een thoracoscopie wordt er aan de zijkant van het bovenlichaam, onder plaatselijke verdoving, onder steriele omstandigheden een soort naald ingebracht, waarvan de punt na inbrengen wordt verwijderd zodat er toegang is tot de ontstane holte voor verder onderzoek en behandeling.

U wordt

.....dag ....., om ..... uur

verwacht bij **de afdeling opname** (op de begane grond).

**Bent u allergisch voor geneesmiddelen of verdoving, gebruikt u medicijnen (bijv. bloedverdunnende medicijnen) laat dit dan voor het onderzoek weten aan de behandelend specialist.**

### **Vorbereiding voor het onderzoek**

U hoeft voor het onderzoek niet nuchter te zijn.

Op de afdeling krijgt u een operatiejasje aan.

Uw blaas moet voor het onderzoek leeg zijn.

U wordt door de afdeling transport naar de functieafdeling gebracht.

## **Het onderzoek**

Het onderzoek kan een uur tot anderhalf uur duren.

Op de functieafdeling wordt u ontvangen en op een ander bed neergelegd op de goede zijde, zodat de kant waar de arts wil inspecteren boven komt te liggen. De arm wordt zo gepositioneerd dat deze niet in de weg ligt en de arts genoeg ruimte heeft.

### **U blijft een lange tijd in een zelfde houding liggen.**

De arts bepaalt door middel van kloppen op uw zijde de insteekplaats en verdooft dan het onderliggende gebied. **Als de verdoving gezet is, is het van groot belang dat u niet meer beweegt.**

Als de verdoving aan het inwerken is, maken de arts en verpleegkundigen zich gereed voor het onderzoek. Als de arts steriel aangekleed is, wordt u toegedekt met groene lakens, dit om een steriel veld te maken.

Hierna start de arts het onderzoek, de verpleegkundige blijft met u contact houden.

De arts maakt een zeer kleine snede waardoor de trocar wordt ingebracht. Hierdoor past instrumentarium zodat de arts de long kan inspecteren, vocht kan wegzuigen en eventueel stukjes weefsel kan wegnemen. Ook kan het longvlies geplakt worden. Indien er stukjes weefsel (biopsie) worden genomen kan dit kortdurend even pijnlijk zijn. Eventueel kan er pijnstilling worden gegeven.

Bij een thoracoscopie wordt altijd een drain achtergelaten die ervoor moet zorgen dat de long weer op zijn plek komt, deze wordt vastgehecht aan de huid. De drain wordt aangesloten aan een zuigpomp die aan uw bed komt te hangen.

## **Na het onderzoek**

U wordt door de verpleegkundigen van de functieafdeling weer in uw eigen bed geholpen en terug gebracht naar de afdeling.

Op de afdeling wordt uw afzuigpomp aangesloten aan een vacuümpomp aan de muur.

Er wordt door de röntgenafdeling op uw kamer een controlefoto gemaakt om te kijken of de drain goed ligt.

Eventueel kunt u om pijnstilling vragen.

Uw behandelend specialist bepaalt het verdere verloop en wanneer de drain verwijderd mag worden. Dit kan enkele dagen duren.

## **De uitslag**

Uw behandelend specialist zal de uitslag met u bespreken.  
Als er weefsel is weggenomen, duurt het 7 á 10 dagen voor de uitslag bekend is.