



## Ooglidcorrectie

Een ooglidcorrectie is een operatieve ingreep die onder plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd. Een ooglidcorrectie is een oplossing voor een te slappe huid van de bovenoogleden.

Hieronder volgt enige uitleg over indicatie en behandeling. Wij wijzen u erop dat een persoonlijk advies slechts gegeven kan worden door de oogarts.

Als gevolg van het ouder worden en ook bij erfelijke aanleg voor deze aandoening worden de oogleden slapper en dunner. De huid van de bovenoogleden gaat dan 'overhangen'. Men krijgt het gevoel dat men constant de wenkbrauwen moet optrekken om beter te kunnen zien. Daardoor zijn de ogen sneller vermoeid.

Meestal is het mogelijk om dit operatief te verhelpen, hierbij wordt het teveel aan huid weggesneden.

### **Wat houdt een operatieve ingreep in?**

Bij de bovenoogleden wordt het teveel aan huid onder plaatselijke verdoving operatief meestal oppervlakkig weggesneden.

Het litteken valt meestal precies in de oogplooi en is na enige tijd (enkele maanden) nagenoeg onzichtbaar. De wondjes worden gehecht en de hechtingen worden na 7 dagen verwijderd door de assistente van de oogarts.

De pijn is in het algemeen gering en meestal zijn pijnstillers niet eens nodig. In verband met een kleine kans op nabloeding is het gebruik van aspirine af te raden.

Na de operatie is het goed om koele kompressen te gebruiken.

Vermijd de eerste dagen grote lichamelijke inspanning, wrijf niet in de ogen en was de oogleden niet.

Eventuele zwellingen of blauwe plekken nemen meestal binnen een paar dagen af. Opvallende littekens bij de oogleden behoren tot de uitzonderingen.

De operatie is gericht op een functionele verbetering. Wat betreft het cosmetische aspect doen wij onze uiterste best om zo netjes mogelijk te hechten.

## **Bloedverdunnende middelen**

Ooglidoperaties kunnen niet worden verricht tijdens het gebruik van bloedverdunnende middelen. Dit zijn allereerst de medicijnen die aspirine of acetylsalicylzuur bevatten. Ook wanneer bloedverdunnende middelen worden gebruikt die door de trombosedienst worden gecontroleerd kunnen ooglidoperaties niet worden verricht.

Ook andere medicijnen kunnen invloed hebben op de operatie. Meld daarom alle medicijnen die u gebruikt aan uw oogarts.

## **Vorbereiding voor de operatie**

In de folder 'Dagbehandeling Chirurgie' kunt u de voorbereidingen voor de operatie lezen. Het gedeelte over narcose is niet voor u van toepassing. U krijgt plaatselijke verdoving.

Voor de ingreep hoeft u niet nuchter te zijn. U kunt gewoon eten en drinken.

## **De operatie**

De operatie vindt plaats op de operatiekamer. Daarom krijgt u ook speciale operatiekleding aan.

De operatie duurt gemiddeld een half uur. Daarna gaat u weer terug naar de afdeling dagverpleging en kunt u, normaal gesproken, na ongeveer een uur weer naar huis.

## **Complicaties**

Ooglidoperaties zijn in het algemeen niet gevaarlijk. Zoals bij elke operatie is er toch een zeker risico aan verbonden. Een blauw oog komt voor maar geneest snel. Lelijke littekens en infecties treden zeldzaam op, evenals het wijken van de wond na het verwijderen van de hechtingen.

Wanneer u na een ooglidoperatie merkt dat het oog gaat uitpuilen of dat u minder gaat zien, dient u contact op te nemen met de assistente van de oogarts.

## **Vragen**

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 17.00 uur via telefoonnummer (0223) 69 62 50.