

Retrograde urethrografie

U bent door uw huisarts/specialist verwezen naar de afdeling radiologie voor een retrograde urethrografie. Dit betekent dat er röntgenfoto's worden gemaakt van de plasbuis, door middel van het inspuiten van een contrastvloeistof.

De afspraak voor u is gemaakt op:

.....dag om uur.

U dient zich 10 minuten voor de afgesproken tijd te melden aan de balie van de afdeling radiologie.

Indien u verhinderd bent, wilt u ons dit dan tijdig laten weten.

Ons telefoonnummer is (0223) 69 63 07.

Heeft u de brief van de specialist al afgegeven bij de afdeling radiologie? Zo niet, deze brief en uw afspraakkaart met registratie-etiket meenemen.

Tijdens de zwangerschap kan dit onderzoek, net als elk ander röntgenonderzoek, schadelijk zijn voor het ongeboren kind.

Bent u zwanger of denkt u dit te zijn, belt u dan de specialist voor nader overleg.

Verloop van het onderzoek

Als u op de onderzoektafel ligt, brengt de radioloog (specialist op de afdeling radiologie) een dun slangetje een klein stukje in de plasbuis. Aan dit slangetje zit een ballonnetje.

Dit ballonnetje wordt opgeblazen zodat het slangetje goed op zijn plaats blijft. Dit kan een drukkend gevoel geven. Door dit slangetje wordt contrastvloeistof gespoten, zodat de gehele plasbuis zich vult. Hiervan worden vervolgens een aantal foto's gemaakt. Dan laat de radioloog het ballonnetje weer leeg lopen en haalt hij het slangetje eruit. De duur van het onderzoek kan variëren van 15 tot 30 minuten.

Wanneer kunt u problemen verwachten

Is de onderstaande situatie voor u van toepassing, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

- U heeft bij een eerder röntgenonderzoek, met toediening van een intraveneuze contrastvloeistof (d.w.z. ingespoten in een ader), een allergische reactie gehad in de vorm van rode vlekken op de huid en/of jeuk en/of benauwdheid.

Na het onderzoek

De contrastvloeistof wordt vanzelf door het lichaam verwijderd. In enkele gevallen kan, na het onderzoek:

- Een licht allergische reactie optreden met rode vlekken op de huid en/of jeuk en/of benauwdheid.

Indien deze verschijnselen binnen 2 uur na toediening van de contrastvloeistof optreden, dient men dit aan de behandelend arts/afdeling radiologie te melden.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u bij uw volgend bezoek aan de polikliniek.

Vragen

Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling radiologie van het Gemini Ziekenhuis. Telefoon (0223) 69 63 07.