

Sachse/Otis

Inleiding

Onderzoek heeft uitgewezen dat er een ingreep aan de urethra (plasbuis) noodzakelijk is.

Deze ingreep wordt Sachse of Otis genoemd. De ingreep is bedoeld om stricturen of een strictuur (vernauwingen) in de plasbuis op te heffen.

Sachse/Otis

De ingreep geschiedt onder algehele narcose of onder plaatselijke verdoving.

Bij een plaatselijke verdoving krijgt u een ruggenprik.

Ofschoon er geen uitwendige wond is, dient de ingreep als een echte operatie beschouwd te worden.

Vorbereiding

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen (zoals marcoumar, acenocoumarol, ascal) gebruikt moet u dit van tevoren melden aan de uroloog. In overleg met de behandelend arts zult u het gebruik van deze medicijnen geruime tijd voor de operatie stoppen.

Gewoonlijk wordt u de dag van de operatie opgenomen.

Werkwijze

Na de anesthesie wordt u in de juiste houding gepositioneerd. U ligt tijdens de operatie met uw benen in de beensteunen. Bij een Sachse wordt een hol instrument in de plasbuis gebracht, waarmee de uroloog de binnenkant van de plasbuis kan bekijken. Daarna wordt het werkelement naar binnen gebracht tot aan de strictuur.

Door het sachsesmesje dat aan het werkelement is bevestigd, heen en weer te bewegen wordt de strictuur gekliefd.(doorsneden). Bij meerdere stricturen wordt nogmaals dezelfde procedure gehaald. Bij de behandeling van de Otis wordt alleen een werkelement ingebracht.

Om de diameter van de urethra op formaat te houden, wordt er na de ingreep een katheter achtergelaten.

De operatie duurt ongeveer 30 minuten.

Nazorg

Wanneer de urine helder gekleurd is en er geen bloedstolsels aanwezig zijn wordt de katheter gewoonlijk binnen 24 uur verwijderd.

Wanneer het plassen hierna goed op gang is gekomen, wordt het ontslag gepland (meestal 1 dag na de operatie).

Volgens afspraak komt u op controle bij uw behandelend arts.

Klachten

Na de operatie kunt u een schrijnend gevoel hebben in de plasbuis.

Soms verliest u wat bloed bij de urine, schrik hier niet van neem rust en drink veel dan is de urine snel weer helder.

Wanneer dit bloedverlies meerdere dagen achtereen aanhoudt, of treedt er koorts op boven de 38,5°C neem dan contact op met uw behandelend arts.

Tot slot

Deze folder treft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven.

Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar worden gemaakt.

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Urologie tussen 08.30 – 12.00 uur en 13.30 – 16.00 uur via telefoonnummer (0223) 69 65 64.