

Blaashals incisie

Algemeen

Onderzoek heeft aangetoond dat er een vernauwing van de blaashals (blaasuitgang) bij u is geconstateerd.

De ingreep die hiervoor wordt verricht wordt een BHI genoemd:
Blaashals incisie

De operatie wordt via de plasbuis uitgevoerd en, dus via de natuurlijke weg.

Incisie wil zeggen dat er een insnede gemaakt wordt in de plasbuis.

De blaashals incisie

De ingreep geschiedt onder algehele narcose of onder plaatselijke verdoving.

Bij een plaatselijke verdoving krijgt u een ruggenprik. Ofschoon er geen uitwendige wond is, dient de ingreep al een echte operatie beschouwd te worden.

Vorbereiding

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen (zoals marcoumar, sintrommitis, ascal) gebruikt moet u dit van tevoren melden aan de uroloog. In overleg met de behandelend arts zult u het gebruik van deze medicijnen geruime tijd voor de operatie stoppen. Gewoonlijk wordt u de dag van de operatie opgenomen.

Werkwijze

Na de anesthesie wordt de blaas geïnspecteerd. Hiervoor ligt u op de rug met uw benen opgetrokken in beensteunen. Er wordt een hol instrumentje in de plasbuis gebracht. Daarmee kunnen we binnenin de plasbuis (urethra) kijken en een insnede maken.

Met een metalen haakje dat van buiten bedienbaar is en aangesloten wordt op een elektrische krachtbron die toelaat te snijden en te coaguleren (dichtbranden). Wanneer de insnede gemaakt is wordt een spoelkatheter geplaatst tegen eventuele nabloeding. De operatie duurt ongeveer 20 minuten.

Nazorg

Wanneer de urine helder gekleurd is en geen bloedstolsel aanwezig zijn wordt de katheter gewoonlijk binnen 24 uur verwijderd. Wanneer het plassen hierna goed op gang is gekomen, wordt het ontslag gepland (meestal 1 tot 2 dagen na de operatie).

Volgens afspraak komt u op controle bij uw behandeld arts.

Klachten

Na de operatie kunt u een schrijnend gevoel hebben in de plasbuis. Soms verliest u wat bloed bij de urine. Schrik hier niet van neem rust en drink veel dan is de urine snel weer helder.

Bij koorts boven de 38,5 °C en wanneer het bloedverlies meerdere dagen achtereen aanhoudt neem dan contact op met uw behandelend arts.

Het totale herstel duurt ongeveer 2 weken.

Sexualiteit

Er is een verschil in de seksualiteit. Hoewel het beleven van het orgasme hetzelfde is, blijft het vaak droog omdat bij de zaadlozing het sperma in de blaas terecht komt en vervolgens wordt uitgeplast. Dit kan absoluut geen kwaad.

Tot slot

Deze folder treft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven.

Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar worden gemaakt.

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Urologie tussen 08.30 – 12.00 uur en 13.30 – 16.00 uur via telefoonnummer (0223) 69 65 64.