

Dorsal Slit

Binnenkort wordt u verwacht voor een Dorsal Slit.

Hiervoor wordt u 1 dagdeel opgenomen op de afdeling dagverpleging.

Helaas is het niet mogelijk dat familieleden of kennissen hierbij aanwezig blijven.

Opname dagverpleging

.....dag,, om uur

Inleiding

In overleg met uw arts zal er bij u een dorsal slit worden verricht. Bij een dorsal slit wordt de voorhuid ingesneden, waardoor deze gemakkelijker terug te trekken is. De meest voorkomende reden hiertoe is een te nauwe voorhuid.

Gevolg hiervan kan zijn dat er moeilijkheden optreden bij plassen, pijn tijdens erectie of geslachtsgemeenschap of een ontsteking van de eikel of voorhuid.

Vorbereiding

De ingreep zal onder plaatselijke verdoving plaats vinden, zodat verdere voorbereidingen niet nodig zijn.

Ingreep

De ingreep duurt ± 20 minuten en zal plaatsvinden op de poliklinische operatiekamer of op de polikliniek urologie.

Na het aanbrengen van de lokale anesthesie wordt de voorhuid ingesneden en de huid gehecht met oplosbare hechtingen. Deze hechtingen lossen na 7 dagen op en hoeven dus niet verwijderd te worden.

Na de ingreep zal de penis zeer gevoelig zijn. Dit zal enige dagen zo blijven. Na de ingreep wordt de penis verbonden met een vettig gaas en vervolgens met steriele gazen.

Nazorg

Na de ingreep is het verstandig om het de rest van de dag rustig aan te doen.

Na het plassen dient u het verband te verschonen. U heeft een recept voor verbandmateriaal meegekregen.

Geadviseerd wordt een stevige onderbroek te dragen en de penis omhoog te dragen. Dit is om zwelling te voorkomen.

U mag geen geslachtsgemeenschap hebben gedurende 6 weken.

Na de ingreep kunt u enkele dagen een branderig gevoel houden.

Om dit te bestrijden kunt u paracetamoltabletten innemen. Ook kunt u enkele dagen een branderig gevoel hebben tijdens het plassen.

Op de plaats van de hechtingen kunnen korstjes ontstaan. Deze kunnen gaan schrijnen.

Complicaties

Basisregel van de wondverzorging is het schoon en droog houden van het wondgebied.

Na het douchen de wond droogdeppen. Het nemen van een bad wordt afgeraden.

Er kan een nabloeding optreden die zich kan uiten in een bloederig verband of een bloeduitstorting onder de hechting. Soms treedt bij een wond genezingsstoornis op in de vorm van infectie.

Indien de pijn steeds erger wordt, er pus of bloed uit de wond komt, de penis steeds dikker wordt of u koorts krijgt boven de 38,5 °C, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Ook kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

Tot slot

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. Dit zal altijd door uw uroloog aan u worden kenbaar gemaakt.

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Urologie tussen 08.30 – 12.00 uur en 13.30 – 16.00 uur via telefoonnummer (0223) 69 65 64.

Belangrijke telefoonnummers

Gemini ziekenhuis : (0223) 69 69 69

Polikliniek Urologie : (0223) 69 65 64