



Retrograde pyelografie

Inleiding

In overleg met uw behandelend arts is besloten bij u een aanvullend nieronderzoek te doen. Wanneer op gewone foto's een eventuele afwijking niet goed of moeilijk te zien is spreekt de uroloog een retrograde pyelografie af. Retrograad betekent teruggaand; een pyelografie is het maken van een röntgenfoto van het nierbekken en de urineleider met behulp van contrastvloeistof.

Soms is het nodig een 'JJ' (dun slangetje) in de urineleider achter te laten. Dit is noodzakelijk wanneer passage van urine uit de nier naar de blaas belemmerd wordt. Dit wordt obstructie genoemd. Wanneer urine moeilijk passeert ontstaat uitzetting van de nier. Dit wordt stuwung genoemd.

Wat is een retrograde pyelografie

Een retrograde pyelografie is een onderzoek waarbij eventuele afwijkingen in de hoge urinewegen in beeld worden gebracht. Via een cystoscoop (dunne, holle kijkbuis waarmee in de blaas gekeken wordt) brengt de uroloog een dunne katheter (slangetje) in de urineleider. Door het inspuiten van contrastvloeistof via deze katheter, kunnen de urineleider en de nier zichtbaar gemaakt worden. De katheter wordt na het onderzoek weer verwijderd.

Wat is een 'JJ'

Een 'JJ' is een dun slangetje dat via de plasbuis in de urineleider en naar de nier wordt opgevoerd en achtergelaten. Het ene uiteinde van het slangetje bevindt zich in de nier, het andere uiteinde in de blaas. Het doel van een 'JJ' is om de urine-afvoer uit de nier te waarborgen.

Waar vindt de behandeling plaats

De behandeling vindt plaats op de poli urologie, u meldt zich op de afgesproken tijd aan de balie van de poli urologie.

Uw voorbereiding op de behandeling

Voor de behandeling zijn geen speciale maatregelen nodig en u hoeft niet nuchter te zijn.

Het is aan te raden voor vervoer naar huis te zorgen en niet zelf te rijden.

Hoe gaat de behandeling

In de kleedkamer kunt u het onderlichaam ontbloten, voordat u op de onderzoektafel plaatsneemt. Vervolgens reinigt de verpleegkundige de schede of de penis met een desinfecterende vloeistof. Daarna wordt een licht verdovende glijstof in de plasbuis gespoten. Belangrijk is dat u, voor zover mogelijk, goed ontspannen bent, zodat het inbrengen van de cystoscoop met het minst mogelijke ongemak gepaard kan gaan. Via deze cystoscoop voert de uroloog een dunne katheter op via de urineleider naar de nier. Het is goed mogelijk dat u tijdens de behandeling een gevoel krijgt van aandrang om te plassen. Dit komt omdat de uroloog steriel water in de blaas laat lopen. Het opvoeren van de katheter naar de nier kan gevoelig zijn. Tijdens de behandeling is een röntgenlaborant aanwezig om de röntgenapparatuur te bedienen, zodat de uroloog foto's kan maken.

Na de behandeling

Er zijn geen beperkingen na de behandeling.

Bij sommige patiënten treedt na de behandeling en soms gedurende enkele dagen een branderig gevoel op bij het plassen en een versterkte plasdrang. Er kan ook wat bloed in de urine zichtbaar zijn. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk. Het is belangrijk dat u veel drinkt, tenminste 1,5-2 liter.

Als er bij u een 'JJ' in de urineleider is achtergelaten, dan is het goed mogelijk dat u het uiteinde van de 'JJ' in de blaas voelt zitten. Meestal gaat dat gevoel over, eventueel kunt u er medicijnen voor krijgen.

Complicaties

Na de behandeling is er een iets verhoogde kans op een urineweginfectie, maar dit komt doorgaans weinig voor. Indien u plasklachten blijft houden, er veel bloed zichtbaar is in de urine, of er hoge koorts optreedt, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de polikliniek urologie.

Heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u op werkdagen tussen 08.30-12.00 en 13.30-16.00 uur contact opnemen met de medewerkers van de polikliniek Urologie. Het telefoonnummer is: (0223) 69 65 64.

Tot slot

Deze informatie betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met de specialist. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit wordt met u besproken.

Mocht u door ziekte of om andere redenen verhinderd zijn, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.