

Pyelumplastiek

Algemeen

U hebt een aangeboren vernauwing van de overgang van het nierbekken naar de urineleider. In overleg met uw arts heeft u besloten tot een operatie waarbij deze vernauwing wordt weggehaald. Deze operatie noemt men een pyelumplastiek. Hiervoor wordt u opgenomen op de afdeling Urologie. Deze folder geeft informatie over de gang van zaken rondom de operatie. Hebt u na het lezen nog vragen, stel ze gerust.

Pyelumplastiek

Bij een pyelumplastiek wordt het vernauwde deel eruit geknipt. Daarna wordt de stomp van de urineleider weer aan het nierbekken gehecht. Deze nieuwe verbinding noemt men ook wel de anastomose

Vorbereiding

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen (zoals sintrommitis, marcoumar, ascal plavix) gebruikt moet u dit van tevoren melden aan de uroloog. In overleg met de behandelend arts zult u het gebruik van deze medicijnen geruime tijd voor de operatie moeten stoppen. U wordt een dag van tevoren opgenomen in het ziekenhuis.

De operatie

Na de ingreep wordt een zogenaamde JJ-katheter, ook wel splint genoemd, achtergelaten tussen de nier en de blaas. Deze zorgt ervoor dat de nieuwe verbinding netjes geneest. Deze katheter blijft twee tot zes weken zitten en wordt verwijderd op de polikliniek. Ook wordt er een blaaskatheter achter gelaten. De katheter is nodig om de operatiewond rust te geven en eventuele bloedstolsels af te laten lopen.

Deze wordt voor u uit het ziekenhuis ontslagen wordt weer verwijderd.

Na de operatie

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht tot u goed wakker bent en alle controles goed zijn. Terug op de afdeling wordt regelmatig een aantal zaken bij u gecontroleerd: met name de bloeddruk, pols, temperatuur en de blaaskatheter. De urine kan er nog wat bloederig uitzien. Dat is normaal en verdwijnt na enige tijd.

Complicaties

Complicaties komen niet veel voor.

Mogelijke complicaties kunnen zijn: nabloeding, wondinfectie, koorts.

De urine kan rood gekleurd zijn door wat bloedbijmenging. Dat kan vooral de eerste dag na de operatie voorkomen.

Verwijderen JJ-katheter

Als u naar huis gaat krijgt u een afspraak mee voor het verwijderen van de JJ-katheter op de polikliniek Urologie.

Voor het verwijderen van de katheter wordt een instrument met een kleine camera in de blaas gebracht. Bij vrouwen gebeurt dit via de plasbuis met een star buisje, bij mannen via de penis met een flexibel instrument.

Herstel periode

Het is belangrijk dat u de eerste weken na de ingreep extra veel drinkt, vooral als er nog bloed bij de urine zit.

Bij problemen, bijvoorbeeld als u niet goed kunt plassen of koorts krijgt, kunt u de eerste week na ontslag direct contact opnemen met het ziekenhuis: overdag met de polikliniek Urologie, 's avonds en 's nachts met de spoedeisende hulp.

De eerste drie tot zes weken na de ingreep is het beter dat u:

- geen zware lichamelijke arbeid verricht.
- geen alcohol drinkt.
- niet fietst.
- en niet perst bij ontlasting(eventueel kan de ontlasting minder hard gemaakt worden met behulp van medicijnen).

Tot slot

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelende arts.

Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar worden gemaakt.

Heeft na het lezen van de folder nog vragen dan kunt op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Urologie tussen 08.30-12.00 uur en 13.30-16.00 uur via telefoon (0223) 69 65 64.