

Medicatie thuis na chirurgische dagbehandeling

Ruimte voor registratie-etiket

Operatiedag Datum

■ Schema

Neem alleen onderstaande pijnstillers in en gebruik geen andere zonder overleg met uw arts! Als u thuis gedurende 24 uur (bijna) geen pijn meer heeft en de pijn voor u acceptabel is, kunt u de pijnstillers verminderen. Heeft u de voorgeschreven pijnstillers ingenomen en na deze periode nog pijn, neem dan contact op met ons ziekenhuis. Contactgegevens vindt u op de laatste pagina van de brochure 'Wel thuis na een behandeling op de dagbehandeling chirurgie'.

paracetamol 500mg 4x daags	2 tabletten om uur	2 tabletten om uur	2 tabletten om uur	2 tabletten om uur
<input type="checkbox"/> diclofenac 50mg 3 x daags	1 tablet om uur	1 tablet om uur	1 tablet om uur	x
<input type="checkbox"/> pantoprazol 40mg 1 x daags	1 tablet om uur	1 tablet om uur	1 tablet om uur	x
<input type="checkbox"/> tramadol 50mg 3 x daags	1 tablet om uur	1 tablet om uur	1 tablet om uur	x
<input type="checkbox"/> oxycontin 2 x daags	1 tablet om uur	1 tablet om uur	1 tablet om uur	x

Overige medicijnen