

Dorsal slit

Afdeling urologie

In overleg met uw arts krijgt u een zogenoemde 'dorsal slit'. Bij een dorsal slit snijdt de uroloog de voorhuid in, waardoor deze gemakkelijker terug te trekken is.

Uw dagopname is gepland opdag,, om uur, op locatie

Waarom een dorsal slit?

De meest voorkomende reden hiertoe is een te nauwe voorhuid. Gevolg hiervan kan zijn dat er moeilijkheden optreden bij plassen, pijn tijdens erectie of geslachtsgemeenschap of een ontsteking van de eikel of voorhuid.

Uw voorbereiding

U verblijft 1 dagdeel op de afdeling dagbehandeling. Helaas is het niet mogelijk dat familieleden of kennissen hierbij aanwezig zijn. De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Gebruikt u bloedstolling remmende medicijnen? Lees dan de instructie hieronder goed door.

Bloedstolling remmende medicijnen tijdelijk stoppen

Gebruikt u bloedstolling remmende medicijnen? Dan *kan* het zijn dat u er tijdelijk mee moet stoppen. Dit is om de kans op en nabloeding te verkleinen. Kijk in het schema of uw bloedstolling remmende medicijn erin staat. Staat deze er tussen? Kijk dan hoeveel dagen u van te voren moet stoppen.



1 dag	2 dagen	2 dagen	3 dagen	5 dagen
	Ontstekingsremmers	Bloedstolling remmende medicijnen	Bloedstolling remmende medicijnen	Bloedstolling remmende medicijnen
Fraxiparine	NSAID's, zoals:	Rivaroxaban Xarelto	Acenocoumarol	Fenprocoumon
	Ibuprofen	Pradaxa Dabigatran		Marcoumar
1 dag	2 dagen	2 dagen	3 dagen	5 dagen

	Naproxen			Acetylsalicylzuur Ascal Clopidogrel Grepid en Plavix
	Voltaren Diclofenac			Aspirine
				Persantin/ Dipyridamol
		Edoxaban		Carbasalaat calcium
		Apixaban Eliquis		

Heeft u twijfels? Neem dan contact op met de polikliniek urologie:

- locatie Alkmaar, telefoon 072 – 548 2600
- locatie Den Helder, telefoon 0223 – 69 6564

De ingreep

De ingreep duurt ongeveer 20 minuten en vindt plaats op de poliklinische operatiekamer of op de polikliniek urologie. Nadat u de verdoving heeft gekregen, snijdt de uroloog de voorhuid in. De uroloog hecht de huid vervolgens met oplosbare hechtingen. Deze hechtingen lossen na 7 dagen vanzelf op. U hoeft deze niet te laten verwijderen. De penis wordt verbonden met een vettig gaas en vervolgens met steriele gazen.

Na de ingreep

Na de ingreep is de penis erg gevoelig. Dit kan enige dagen zo blijven. Het is verstandig om het de rest van de dag rustig aan te doen. Na het plassen moet u het verband verschonen. U heeft een recept voor verbandmateriaal meegekregen. Wij adviseren om een stevige onderbroek te dragen en de penis omhoog te dragen. Dit is om zwelling te voorkomen.

Nazorg

Na de ingreep kunt u enkele dagen een branderig gevoel houden. Om dit te bestrijden kunt u paracetamoltabletten innemen. Ook kunt u enkele dagen een branderig gevoel hebben tijdens het plassen. Op de plaats van de hechtingen kunnen korstjes ontstaan. Deze kunnen gaan schrijnen. U mag geen geslachtsgemeenschap hebben gedurende 6 weken.

Wondverzorging

Basisregel van de wondverzorging is het schoon en droog houden van het wondgebied. Na het douchen de wond droogdeppen. Het nemen van een bad raden wij af.

Complicaties

Er kan een nabloeding optreden. Dit merkt u aan een bloederig verband of een bloeditstorting onder de hechting. Soms treedt een wond genezingsstoornis op in de vorm van infectie. Neem contact op met uw behandelend arts als:

- de pijn steeds erger wordt
- er pus of bloed uit de wond komt
- de penis steeds dikker wordt
- u koorts krijgt boven de 38,5 °C

Ook kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp:

- locatie Alkmaar, telefoonnummer 072 – 548 2480
- locatie Den Helder, telefoonnummer 0223 – 69 6661

Uw vragen

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek urologie tussen 08:30 – 16:30 uur:

- locatie Alkmaar, telefoonnummer 072 – 548 2600
- locatie Den Helder, telefoonnummer 0223 - 69 6564