


Hasta bilgilendirme

Loğusalık ile ilgili telefon talimatı

Aramamak (normal)		Aramak
 <ul style="list-style-type: none">her 3 saatte bir yeni bir loğusalık pedi   <ul style="list-style-type: none">24 saat içinde (1 gün) 2 yumruk büyüklüğünde pıhtı	Kan kaybı	 <ul style="list-style-type: none">yarım saat içinde sırlıslıklam olan bir doğum pedi 
 <ul style="list-style-type: none">günde 2x ateşi ölçünateş 38.0°C'nin altında	Yüksek ateş loğusa bakıcısı	 <ul style="list-style-type: none">ateş 38.0°C'nin üzerindedir
 <ul style="list-style-type: none">doğum sonrasında 6 saat içinde idrara çıkabilmek   <ul style="list-style-type: none">İpucu: her 3 saatte bir idrara çıkın	İdrara çıkmak loğusa bakıcısı	 <ul style="list-style-type: none">doğumdan 6 saat sonrasında hâlâ idrara çıkmış olamamakdamlacıklar şeklinde idrara çıkmak/ idrara çıkamamakidrara çıktıktan sonra idrar yapma ihtiyacını hissetmek 
 <ul style="list-style-type: none">pembe renkte cilt rengieller ve ayaklarda mavilik	Bebegin rengi	 <ul style="list-style-type: none">vücutta mavilik, dilde mavilik veya dudaklarda mavilikbeyaz/soluk vücut rengivücut rengi sarı  

Arka tarafa bakınız

Hasta bilgilendirme

Loğusalık ile ilgili telefon talimatı

Aramamak (normal)



- bebeklerin nefes alması yetişkinlerden daha hızlıdır
- düzensiz şekilde nefes almak
- horlamak veya sesler çıkarmak


Bebegin nefes alması

Aramak



- dakikada 60 kereden daha fazla nefes almak
- nefes almakta zorlanmak
- nefes almakta inlemek
- göğüs kafesinde çekilmeler
- nefes alırken genişlemiş olan burun delikleri

36.5 - 37.5



- günde 2 kez makattan ateş ölçmek
- ateş 36.5°C - 37.5°C arasında
- elleri ve ayakları hissetmek ilk 24 saat çoğu zaman soğuktur

Bebegin ateşi

↓ 36.5 ↑ 37.5



- ateş 36.5°C'nin altında
- ateş 37.5°C'üzerinde

Endişe



- endişeli veya kaygılıysanız: edinilmiş bilgiler anlaşılır
- olmadığında her zaman arayın



Doğum uzmanlığı merkezini arayın