



Informatie LETZ- behandeling van afwijkingen aan de baarmoederhals

LETZ = Lis Excisie van de Transformatie Zone

U staat ingepland voor een ingreep op de poliklinische OK van het Gynaecologisch Centrum.

Deze bevindt zich aan de Comeniusstraat 3 te Alkmaar

Datum en tijdstip vindt u in het Noordwest patiënten-portaal.

Graag vragen wij uw aandacht voor de onderstaande informatie voor uw ingreep.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze altijd aan ons stellen. Dat mag mondeling op de dag van de ingreep of u kunt van te voren een mail sturen naar afspraak@gcalkmaar.nl

Team Gynaecologisch Centrum Alkmaar

Waarom deze behandeling?

Bij u is een afwijkend uitstrijkje van de baarmoederhals vastgesteld. Vervolgens is er colposcopie-onderzoek verricht. Hierbij is met een vergrotende lens naar de baarmoedermond gekeken. Tijdens het colposcopisch onderzoek zijn kleine stukjes weefsel weggenomen voor onderzoek. Naar aanleiding van de bevindingen van dit weefselonderzoek is het nodig de afwijkingen aan de baarmoederhals te verwijderen.

Bij u is gekozen om dat te doen door middel van een behandeling met LETZ.

Wat is een LETZ-behandeling?

Bij een LETZ-behandeling wordt het afwijkend gebied aan de baarmoederhals verwijderd met een dun staal draadje (0.25 mm dikte) waardoor een elektrische stroom gaat. Een andere naam voor dit staal draadje is een 'diathermische lus'.

Deze ingreep heeft na genezing geen invloed op geslachtsgemeenschap of eventuele zwangerschap.

De behandeling

De behandeling kan goed onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd.

Van belang is dat u er zeker van bent niet zwanger te zijn tijdens deze ingreep. Mocht bij gebruik van de pil de ingreep in de stopweek, dus tijdens de menstruatie gepland zijn, dan is het verstandig de pil



wat langer door te slikken.

De aanwezigheid van een spiraal is geen belemmering voor de behandeling. Mocht u op de dag van de ingreep hevig menstrueren, dan lijkt uitstel verstandig.

De meeste vrouwen zien tegen de ingreep op, maar vrijwel iedereen zegt dat het erg meeviel en dat ze (vrijwel) niets gevoeld hebben. U kunt meestal kort na de behandeling weer naar huis.

Voor het uitvoeren van de behandeling neemt u plaats op de gynaecologische onderzoeksstoel en de gynaecoloog brengt een speculum in. De baarmoederhals wordt plaatselijk verdoofd. Soms wordt eerst weer een colposcopie verricht.

Daarna wordt het afwijkende gebied verwijderd met de diathermische lus. Vervolgens worden de nog bloedende vaatjes dichtgeschroeid.

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Het verwijderde weefsel wordt ingestuurd voor laboratoriumonderzoek onder de microscoop (PA-onderzoek). Bij een lis excisie is het moeilijk een uitspraak te doen of het weefsel radicaal verwijderd is, dat blijkt pas bij latere uitstrijkjes.

Weer thuis

- Een heel enkele keer gebeurt het dat er na thuiskomst een nabloeding ontstaat. In dat geval kunt u direct contact opnemen met Gynaecologisch Centrum Alkmaar.

Het telefoonnummer is: overdag: 072-514 21 60

Voor 's avonds, 's nachts en in het weekend krijgt u na de operatie het spoednummer mee van het ziekenhuis.

- Een geringe hoeveelheid bloedverlies of verlies van bloederig vocht gedurende de eerste twee weken na de behandeling is normaal. Als dit echter langer dan twee weken aanhoudt, is het zinvol om met de behandelend arts te overleggen.
- Wij raden aan direct contact op te nemen bij etterige afscheiding, koorts en buikpijn.
- De totale wondgenezing duurt ongeveer vier weken. Gedurende deze periode mag u geen geslachtsgemeenschap hebben.
- Zolang er bloedverlies is, mag u niet baden, niet zwemmen en géén tampons gebruiken.
- U mag wel douchen.
- Ook is het verstandig de eerste week zware inspanning of sport te vermijden.
- Normale werkzaamheden kunt u meestal binnen een week hervatten.

Verdere controles

- U krijgt na 2 weken via een telefonische afspraak bericht over de PA-uitslag van het weefsel.



- Als uit het onderzoek van het weefsel is gebleken dat de behandeling afdoende is geweest, vinden verdere controles plaats op de polikliniek.
- Na 6 en 24 maanden wordt opnieuw een uitstrijkje gemaakt.
- Daarna worden de uitstrijkjes weer in het schema van het bevolkingsonderzoek verricht.