

Een verzwikte enkel

www.nwz.nl

Inhoud

Verzwikken	4
De behandeling	4
Onderzoek	4
Herstel	5
Wanneer neemt u contact op met de Breuklijn?	5
Oefeningen	5
Uw vragen	6

Na de behandeling van uw verzwikte enkel gaat u weer naar huis. Bij een verzwikking klapt uw voet plotseling naar binnen. Het gevolg is een pijnlijke en dikke enkel. Wanneer spreken we van een verzwikte enkel? Wanneer is onderzoek nodig en wat kunt u zelf doen? Dat en meer leest u in deze folder.

Samenvatting

- na een verkeerde stap of beweging klapt uw voet soms naar binnen of buiten. De enkelband aan de buitenkant van uw enkel rekt uit of scheurt in
- een uitgerekte enkelband geneest in de meeste gevallen vanzelf
- bij een verzwikte enkel is een controle afspraak niet nodig
- een drukverband geeft ondersteuning, maar versnelt de genezing niet
- lopen bevordert het herstel. Probeer zo snel mogelijk of u weer kunt lopen. Doe dit op geleide van de pijn
- voorkom dat de enkel stijf wordt en beweeg uw voet regelmatig heen en weer. Fietsen is een goede manier om uw enkel te bewegen
- oefeningen kunt u terugvinden in de Virtual Fracture Care app
- als er tijdens het herstel vragen of problemen zijn, kunt u op maandag t/m vrijdag van 8.30-10.00 uur en 13.30-15.00 uur contact opnemen via de 'breuklijn' 072 548 2465

■ Verzwikken

Na een verkeerde stap of beweging klapt uw voet soms naar binnen of buiten. Dit noemen we verzwikken, distorsie of verstuiken. De enkelband aan de buitenkant van uw enkel rekt uit of scheurt in. Hierbij ontstaan vaak kleine scheurtjes in de enkelband en bloedvatjes. Het komt bijna nooit voor dat de enkelband helemaal afscheurt. Na het verzwikken kan een zwelling ontstaan. Er ontstaat vaak een balvormige blauwe plek, meestal aan de buitenzijde van de enkel.

■ De behandeling

- probeer te voorkomen dat u uw enkel opnieuw zwikt. Met krukken kunt u uw enkel ontzien. Afhankelijk van de situatie krijgt u een drukverband of een elastische kous (tubigrip)
- een drukverband geeft ondersteuning, maar versnelt de genezing niet. Het drukverband kunt u 3-5 dagen laten zitten. De elastische kous mag u uitlaten tijdens het douchen en 's nachts
- lopen bevordert het herstel. Probeer zo snel mogelijk of u weer kunt lopen. Zet bij het lopen uw voet recht naar voren. Verergert de pijn door het lopen? Ga dan niet door, maar probeer het weer de volgende dag
- voorkom dat de enkel stijf wordt en beweeg uw voet regelmatig heen en weer. Ook als u zit of ligt
- leg uw voet hoog zodat de zwelling minder kan worden en tegen mogelijke pijn. Uw voet ligt hoger dan uw knie, en uw knie ligt hoger dan uw billen. Eventueel kunt u uw matras ophogen door er een kussen onder te leggen
- koelen kan de pijnklachten verlichten, maar vermindert niet de zwelling. Koelen kan met ijsblokjes in een plastic zak of met een 'ice-pack'. Wikkel het ijs in een theedoek om te voorkomen dat de huid bevriest
- fietsen is een goede manier om uw enkel te oefenen
- wees voorzichtig met sporten waarbij de kans op zwikken extra groot is, bijvoorbeeld veldsport op onregelmatig terrein

■ Onderzoek

Vanwege de zwelling is onderzoek van de enkelbanden soms niet goed mogelijk. Dit kan pas na 4 tot 7 dagen als de zwelling minder is geworden door uw (huis)arts. Soms maken we een afspraak op de polikliniek in het ziekenhuis.

■ Herstel

Uitgerekte enkelband

- een uitgerekte enkelband geneest vanzelf. De eerste dagen kan de enkel pijnlijk en gezwollen zijn. Het lopen gaat dan moeilijk. Na 3 of 4 dagen wordt de pijn meestal minder en kunt u uw voet meer belasten. U heeft dan geen krukken meer nodig
- na een paar dagen neemt de zwelling af. Vaak kleurt de hiel, de buitenkant van de voet en de tenen ook blauw (en later groen en geel)
- meestal kunt u na 2 weken weer normaal lopen, fietsen en springen

(In)gescheurde enkelband

- een (in)gescheurde enkelband geneest vanzelf. Het herstel duurt langer. Het duurt minstens 2 weken voordat u weer kunt lopen en fietsen. U kunt dan met krukken lopen. Het kan een aantal maanden duren voordat u weer kunt sporten
- bij een (in)gescheurde enkelband kan een behandeling met een enkelbrace helpen bij het herstel. Dit kan als er geen zwelling meer is
- als de enkel bijna genezen is, kan deze tijdens of na een inspanning pijn doen of iets opzwellen. Dat is normaal en het kan geen kwaad. U hoeft de enkel niet te ontzien.

■ Wanneer neemt u contact op met de Breuklijn?

- als de pijn of de zwelling na 4 dagen niet minder wordt
- als er na 4 dagen nog klachten zijn terwijl er geen zwelling is

■ Oefeningen

Na letsel van de enkelbanden kan stijfheid, krachtsverlies en een verstoorde coördinatie optreden. Onderstaande oefeningen helpen om dit tegen te gaan.

Wanneer welke oefening?

Het is belangrijk dat u direct zo veel mogelijk begint met oefenen, als de pijn dit toelaat. Dit voorkomt dat de enkel stijf wordt. Begin met onbelast oefenen, dit zijn oefeningen die u doet zonder op de voet te staan. Start daarna met belast

oefenen. Oefen alleen als de pijn dit toelaat.

Volg onderstaande instructies:

- doe de oefeningen minstens 3 keer per dag
- voer elke oefening 10 tot 15 keer uit
- bouw geleidelijk op, neem zo nodig rust na het doen van oefeningen door het been weer hoog te leggen
- u kunt eventueel in warm water oefenen

Onbelast oefenen

- bekijk de video's in de Virtual Fracture Care App – onder folder: Weber A/ avulsie bij enkelbandletsel
- breid op advies uit naar 'belast oefenen' en wanneer de pijn dit toelaat

Belast oefenen

- bekijk de video's in de Virtual Fracture Care App – onder folder Weber A/ avulsie bij enkelbandletsel

■ **Uw vragen**

U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op www.nwz.nl

Contact maandag t/m vrijdag tussen 8.30-10.00 uur en 13.30-15.00 uur

- breuklijn: 072 - 548 2465

De Virtual Fracture Care app

Open de camera op uw telefoon en richt hem op de QR-code. U wordt automatisch naar de app verwezen.



Noordwest Ziekenhuisgroep

Postbus 501

1800 AM Alkmaar

www.nwz.nl

tel 072 - 548 4444

Colofon

Redactie chirurgie
 communicatie

Druk Ricoh

Bestelnummer 313065

Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl