

Malletvinger

www.nwz.nl

Inhoud

De behandeling	4
Behandeling bij een breuk	4
Behandeling zonder breuk (scheur pees)	4
Instructies	5
Herstel	5
Spalk vervangen	6
Oefeningen	6
Uw vragen	6

U heeft een malletvinger, ook wel hamervinger genoemd. Bij een malletvinger kunt u het kootje aan de top van uw vinger niet strekken. Dit komt omdat de pees is afgescheurd of omdat een stukje bot met de pees is afgebroken.

Samenvatting

- de pees aan de top van uw vinger is beschadigd, waardoor u uw vinger niet meer kunt strekken. Dit heet een malletvinger
- dit letsel herstelt doorgaans zonder restklachten.
- we maken geen standaard poliklinische controle afspraak, deze is over het algemeen niet nodig
- de malletvinger kan met of zonder breuk voorkomen. Let op dat u het behandelprogramma passend bij uw letsel volgt.
- u moet de spalk continu (non-stop), 24 uur per dag, dragen
- u krijgt een verwijzing voor de handenfysiotherapeut. U kunt een afspraak maken met de handtherapeut na 6w (bij een breuk) of 8 weken (bij een afgescheurde pees)
- meer informatie vindt je in de Virtual Fracture Care App
- als er tijdens het herstel vragen of problemen zijn, kunt u maandag t/m vrijdag van 8.30-10.00 uur en 13.30-15.00 uur contact opnemen via de 'breuklijn', 072 - 548 2465

■ De behandeling

Een malletvinger komt vaak voor. Een operatie is meestal niet nodig.

Er zijn 2 mogelijkheden:

- u bent tijdens kantoor tijd op de Spoedeisende Hulp gekomen: in principe krijgt u meteen op de gipskamer een speciaal op maat gemaakte spalk om uw vinger recht te houden
- u bent buiten kantoor tijd op de Spoedeisende Hulp gekomen:
 - u krijgt een tijdelijke spalk
 - we verwachten u de eerstvolgende werkdag bij de gipskamer. Hiervoor kunt u een afspraak maken via de Breuklijn
 - als u een afspraak heeft, kunt u zich melden bij de gipskamer. Hier leggen we een speciaal op maat gemaakte spalk aan

Een malletvinger kan wel of geen breuk hebben. De zorgverlener op de afdeling spoedeisende hulp vertelt u of er sprake is van een breuk of van een scheur in de pees.

■ Behandeling bij een breuk

week 0 - 6	• continu spalk dragen
week 6 - 8	• start handtherapie (na advies therapeut starten met oefeningen) • Spalk dragen in de nacht en bij risicomomenten

■ Behandeling zonder breuk (scheur pees)

week 0 - 8	• continu spalk dragen
week 8 - 10	• start handtherapie (na advies therapeut starten met oefeningen) • spalk dragen in de nacht en bij risicomomenten

■ Instructies

Volg de volgende instructies voor een zo goed mogelijke genezing.

- u moet de spalk continu (non-stop, 24 uur per dag) dragen
- als u de spalk toch afdoet en de vinger buigt, moet de genezing weer opnieuw beginnen. U begint dan weer van voren af aan met het tellen van de weken. De kans op volledige genezing is dan kleiner!
 - heeft u een afgescheurde pees? Dan moet u de spalk 8 weken dragen
 - heeft u een breuk? Dan moet u de spalk 6 weken dragen
- hierna moet u de spalk nog 2 weken in de nacht dragen. Op advies van de handtherapeut moet u de spalk soms langer dragen
- draag de spalk ook overdag bij activiteiten waarbij de vinger het risico loopt om geblesseerd te raken
- de vinger en spalk mogen niet nat worden. Dit is om irritatie en verweking van de huid te voorkomen
- heeft u pijn? Gebruik dan paracetamol. Wacht niet met paracetamol nemen totdat u te veel pijn heeft. Neem het altijd verspreid over de dag in. U kunt maximaal 4x per dag 2 tabletten van 500 mg paracetamol innemen op vaste tijden

■ Herstel

- u krijgt een verwijzing voor de handenfysiotherapeut. U kunt een afspraak maken met de handtherapeut na 6w (bij een breuk) of 8 weken (bij een afgescheurde pees). De handtherapeut beoordeelt wanneer u kunt beginnen met oefenen. Hij of zij geeft u instructies over het oefenen van de vinger en het gebruik in het dagelijks leven. Let hierbij op dat u de oefeningen langzaam opbouwt en geen plotselinge knijpbewegingen maakt. Als u dit wel doet, kan de pees opnieuw beschadigen
- in principe is de vinger na 3 maanden weer volledig belastbaar

■ Spalk vervangen

U mag de spalk tussentijds absoluut niet zelf verwijderen. Neem bij een te ruime spalk of om hygiënische redenen contact op met de Breuklijn.

■ Oefeningen

Het is belangrijk dat u **geen** oefeningen doet met de vinger voordat u bij de handtherapeut bent geweest. Als u mag beginnen met oefeningen, zal de handtherapeut u specifieke oefeningen geven.

■ Uw vragen

Als u vragen heeft kunt u op maandag t/m vrijdag van 8.30-10.00 uur en 13.30-15.00 uur contact opnemen via de breuklijn 072 - 548 2465. Als een controle noodzakelijk is, maken we een afspraak. Neem ook contact op met de breuklijn als:

- de pijn erg toeneemt
- tijdens de oefenperiode het topje toch weer gaat hangen
- de spalk niet meer mooi aansluit
- de spalk schoongemaakt moet worden

De Virtual Fracture Care app

Open de camera op uw telefoon en richt hem op de QR-code. U wordt automatisch naar de app verwezen.



■ **Notities**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Noordwest Ziekenhuisgroep

Postbus 501

1800 AM Alkmaar

www.nwz.nl

tel 072 - 548 4444

Colofon

Redactie chirurgie
 communicatie

Druk Ricoh

Bestelnummer 313105

Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl