

Botox in de blaas

Informatie over de behandeling

In overleg met uw uroloog is besloten dat u een behandeling krijgt met Botox-injecties voor uw overactieve blaas. In deze folder vindt u informatie over de behandeling en uw voorbereiding.

Wat is Botox?

Botulinetoxine is een medicinale stof die de signaaloverdracht van zenuwvezels naar spieren onderbreekt. In het geval van Botox: als Botox in een spier wordt gespoten kan die spier geen signaal meer ontvangen en komt tot rust.

Waarom Botox-injecties

Een overactieve blaas betekent meestal dat u vaak moet plassen en dat u voorafgaand aan het plassen hevige aandrang voelt. In de urologie wordt Botox gebruikt voor de behandeling van een overactieve blaasspieren en hoge drukblaas. Na injectie van Botox in de blaasspier verdwijnen bij 8 van de 10 patiënten de klachten van de overactieve blaas.

Uw voorbereiding

2 weken voor de behandeling: urinekweek

U levert 2 weken voor de behandeling uw verse urine in voor een urinekweek. U heeft een potje meegekregen en een uitleg over het vullen van het potje. U levert het potje in bij het laboratorium of bij Starlet. Zorg ervoor dat op de potjes/ buisjes uw naam, geboortedatum staat of plak de stickers die u heeft gekregen erop.

Bloedstolling remmende medicijnen

Gebruikt u bloedstolling remmende medicijnen, lees dan de instructie op de volgende pagina goed door. Het kan zijn dat u er tijdelijk mee moet stoppen. Dit is om de kans op een nabloeding te verkleinen.

Kijk in het schema hieronder of uw bloedstolling remmende medicijn erin staat. Staat deze er tussen? Kijk dan hoeveel dagen u van te voren moet stoppen.

1 dag	2 dagen Ontstekings- remmers	2 dagen Bloedstolling remmende medicijnen	3 dagen Bloedstolling remmende medicijnen	5 dagen Bloedstolling remmende medicijnen
Fraxiparine	NSAID's zoals:	Rivaroxaban Xarelto	Acenocoumarol	Fenprocoumon
	Ibuprofen	Pradaxa Dabigatran		Marcoumar
	Naproxen			Acetylsalicylzuur Ascal Clopidogrel Grepid en Plavix
	Voltaren Diclofenac			Aspirine
				Persantin/ Dipyridamol
		Edoxaban		Carbasalaat caldium
		Apixaban Eliquis		

Behandeling

U wordt opgenomen op de dagbehandeling. De behandeling wordt gedaan op de polikliniek urologie. Voor deze ingreep krijgt u:

- sedatie. Meer informatie leest u in de folder 'Procedurele sedatie en/of analgesie'. U vindt deze folder op nwz.nl/patientenfolders, of
- lokale verdoving

Uw uroloog overlegt met u wat voor u van toepassing is.

Injecties

Voor het juiste effect wordt Botox direct in de blaasspier gespoten (geïnjecteerd). Dit gebeurt op ongeveer 20 tot 25 plaatsen in de blaas. Hiervoor gebruikt de uroloog een lange injectienaald die door een cystoscoop via de plasbuis naar binnen wordt gebracht. Hiermee wordt op de juiste plaatsen in de blaaswand een zeer kleine hoeveelheid Botox geïnjecteerd.

Na de behandeling

Niet kunnen plassen

Heel soms komt het voor dat u langere tijd niet kunt plassen. U moet uzelf dan enkele keren per dag katheteriseren, om de blaas te legen. Mocht zelfkatheterisatie nodig zijn, dan leren we u op de polikliniek urologie hoe dit moet. Als u twijfelt over zelfkatheterisatie, dan kunnen wij u dit voorafgaand aan de behandeling leren.

Uw stoelgang

Om goed te kunnen plassen is een goede stoelgang belangrijk. Verstopping of harde ontlasting, ook wel obstipatie genoemd bemoeilijkt het uitplassen. Heeft u last van obstipatie, bespreek dit dan met de uroloog, continentieverpleegkundige of met uw huisarts als u er voor uw behandeling al last van heeft.

Resultaat

Het resultaat van de behandeling kan per persoon erg verschillen. Meestal is het resultaat na 4 tot 10 dagen merkbaar. U merkt dat u minder aandrang voelt en daardoor minder vaak hoeft te plassen. Botox is effectief bij 8 van de 10 patiënten en werkt gemiddeld 6 tot 12 maanden. Als het is uitgewerkt kan de Botox behandeling herhaald worden.

Wanneer waarschuwt u het ziekenhuis of uw huisarts?

Waarschuw uw huisarts of de polikliniek urologie als:

- u een blaasontsteking krijgt
- er na 2 weken nog bloed of bloedstolsels bij uw urine zit en dit niet vermindert
- u hevig brandende pijn heeft bij het plassen
- u niet meer kunt plassen
- u koorts heeft boven de 38,5 graden

Uw vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust. U kunt dan van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 16:30 uur contact opnemen met de polikliniek urologie van Noordwest Ziekenhuisgroep via telefoonnummer:

- locatie Alkmaar, 072 – 548 2600
- locatie Den Helder, 0223 - 69 6564